



과다 복용으로 인한 사망(라틴계 뉴욕 시민), 2022년

종종 단일 그룹으로 설명되지만 뉴욕시(NYC)의 라티노/라티나는 20개 이상의 고유한 출신 국가 또는 민족¹ 그룹을 나타냅니다. 이 자료표는 다음과 같이 뉴욕시에서 가장 큰 라티노/라티나 민족 그룹의 과다 복용으로 인한 사망의 차이점을 강조합니다. 푸에르토리코인, 도미니카인, 중남미인 및 멕시코인.


라틴계 뉴욕 시민은 과다 복용으로 인한 사망자 수가 두 번째로 많았습니다.




라틴계 뉴욕 시민은 과다 복용으로 인한 사망자 수(100,000명의 주민당)가 두 번째로 많았습니다.



라티노/라티나 뉴욕 시민은 뉴욕시 인구의 28%를 차지합니다. 뉴욕시에서 가장 많은 라티노/라티나 민족 그룹은 푸에르토리코인과 도미니카인입니다.




라틴계 뉴욕 시민은 과다 복용으로 인한 사망자의 34%를 차지합니다. 인구 추정치와 비교하면 푸에르토리코인 뉴욕 시민의 과다 복용으로 인한 사망율이 더 높았습니다.




¹이 간행물의 목적상 라티노/민족은 사망 증명서에 보고됩니다. 보고되지 않은 경우 누락된 것으로 설명됩니다.

출처: 미국 인구조사국에서 실시한 미국 지역사회 설문조사의 통합 공용 마이크로데이터 시리즈를 참조한 인구 분모 추정치(2016~2020년). 라티노/라티나 인구 분모는 2000~2020년 미국 인구 조사국(Census Bureau)에서 보관한 인구 조사간 인구 추정치(2021년 10월 업데이트)를 수정한 뉴욕시 보건 및 정신 위생국(NYC 보건부 인구 추정치를 참조했습니다. 과다 복용으로 인한 사망률 데이터는 15세~84세의 사람들로 제한되었으며, 2022년 뉴욕시 수석 법의관실(Office of the Chief Medical Examiner)과 뉴욕시 보건부(Health Department)의 인구통계국(Bureau of Vital Statistics)의 데이터를 발췌하였습니다. 알코올, 약물 사용, 예방, 관리 및 치료 부서별 분석. 2022년 자료는 잠정치이며 변경될 수 있습니다.

라틴계 뉴욕 시민 중 푸에르토리코인 뉴욕 시민의 과다복용으로 인한 사망이 가장 많았습니다. 약물 과다 복용으로 사망한 라틴계 뉴욕 시민 3명 중 1명의 사망 진단서에 민족 정보가 누락되어 있습니다.




푸에르토리코인 뉴욕 시민의 과다 복용으로 인한 사망률은 전체 라티노/라티나 뉴욕 시민의 사망률보다 높았습니다.



*누락된 민족 데이터에 대해서는 사망률을 계산할 수 없습니다.

푸에르토리코인 뉴욕 시민의 약물 과다 복용으로 인한 사망률은 남성과 35~54세에서 가장 높았습니다.



라틴계 뉴욕 시민의 약물 과다 복용으로 인한 사망과 관련된 약물(과다 복용으로 인한 사망에는 두 가지 이상의 약물이 포함될 수 있음):

