


الوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة بين سكان منطقة Bronx، لعام 2022


من سكان Bronx من بين كل 100000 من السكان توفوا بسبب تناول جرعة زائدة من العقاقير. **73.6**

سجل سكان Bronx أعلى معدلات الوفاة الناتجة عن تناول جرعة زائدة (من بين كل 100000 من السكان).




من سكان منطقة Bronx توفوا بسبب تعاطي جرعة زائدة من المخدرات. **831**


سجل سكان منطقة Bronx أكبر عدد للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.




سجل سكان منطقة Bronx ممن تتراوح أعمارهم بين 55 و 84 عامًا أعلى معدل للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.




سجل سكان منطقة Bronx ممن تتراوح أعمارهم بين 35 و 54 عامًا أكبر عدد للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.




سجل سكان منطقة Bronx من البيض أعلى معدل للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.



سجل سكان منطقة Bronx ذوو الأصل اللاتيني أكبر عدد للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.



المواد المرتبطة بالوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة من المخدرات (من الممكن أن ترتبط الوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة بأكثر من نوع واحد من المواد):



المصدر: مكتب Office of the Chief Medical Examiner (مكتب كبير الأطباء الشرعيين) في مدينة نيويورك ومكتب إحصاءات الأحوال المدنية التابع لإدارة الصحة والسلامة العقلية في مدينة نيويورك، لعام 2022. تحليل أعده مكتب Bureau of Alcohol, Drug Use, Prevention, Care and Treatment (مكتب الوقاية وتقديم الرعاية والعلاج لحالات إدمان الكحول والمخدرات). لبيانات لعام 2022 مؤقتة. خاضعة للتغديس.