


الوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة بين سكان منطقة Queens، لعام 2022

من سكان Queens من بين كل 100000 من السكان توفوا بسبب تناول جرعة زائدة من العقاقير.

24.2

سجل سكان Queens أقل معدلات الوفاة الناتجة عن تناول جرعة زائدة (من بين كل 100000 من السكان).




من سكان منطقة Queens توفوا نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات.

469


سجل سكان منطقة Queens ثالث أكبر عدد للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.




سجل سكان منطقة Queens ممن تتراوح أعمارهم بين 35 و 54 عامًا أعلى معدل للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.




سجل سكان منطقة Queens ممن تتراوح أعمارهم بين 35 و 54 عامًا أكبر عدد للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.




سجل سكان منطقة Queens من أسود أعلى معدل للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.



سجل سكان منطقة Queens من أسود أكبر عدد للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.



المواد المرتبطة بالوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة من المخدرات (من الممكن أن ترتبط الوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة بأكثر من نوع واحد من المواد):



المصدر: مكتب Office of the Chief Medical Examiner (مكتب كبير الأطباء الشرعيين) في مدينة نيويورك ومكتب إحصاءات الأحوال المدنية التابع لإدارة الصحة والسلامة العقلية في مدينة نيويورك، لعام 2022. تحليل أعدته مكتب Bureau of Alcohol, Drug Use, Prevention, Care and Treatment (مكتب الوقاية وتقديم الرعاية والعلاج لحالات إدمان الكحول والمخدرات). لبيانات لعام 2022 مؤقتة وخاضعة للتغيير.