


# الوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة بين سكان Staten Island، لعام 2022


من سكان Staten Island من بين كل 100000 من السكان توفوا بسبب تناول جرعة زائدة من العقاقير. **38.0**

سجل سكان Staten Island ثاني أعلى معدل للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.




من سكان Staten Island توفوا بسبب تعاطي جرعة زائدة من المخدرات. **152**


سجل سكان Staten Island أقل عدد لحالات الوفاة الناتجة عن تناول جرعة زائدة.




سجل سكان Staten Island ممن تتراوح أعمارهم بين 35 و 54 عامًا أعلى معدل للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.




سجل سكان Staten Island ممن تتراوح أعمارهم بين 35 و 54 عامًا أكبر عدد للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.




سجل سكان Staten Island من أسود أعلى معدل للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.



سجل سكان Staten Island من البيض أكبر عدد للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.



المواد المرتبطة بالوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة من المخدرات (من الممكن أن ترتبط الوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة بأكثر من نوع واحد من المواد):



المصدر: مكتب Office of the Chief Medical Examiner (مكتب كبير الأطباء الشرعيين) في مدينة نيويورك ومكتب إحصاءات الأحوال المدنية التابع لإدارة الصحة والسلامة العقلية في مدينة نيويورك، لعام 2020. تحليل أعدته مكتب Bureau of Alcohol, Drug Use, Prevention, Care and Treatment (مكتب الوقاية وتقديم الرعاية والعلاج لحالات إدمان الكحول والمخدرات). لبيانات لعام 2022 مؤقتة وخاضعة للتغيير.