


# 과다 복용으로 인한 사망(Staten Island 주민), 2022 년


**152 명** Staten Island 주민들은 약물 과다 복용으로 사망했습니다.

**38.0 명** Staten Island 주민은 100,000명당 1명이 약물 과다 복용으로 사망했습니다.


Staten Island 주민은 과다 복용으로 인한 사망자 수가 가장 적었습니다.




Staten Island 주민들은 과다 복용으로 인한 사망률이 두 번째 가장 높았습니다.




35~54세의 Staten Island 주민들은 과다 복용으로 인한 사망자 수가 가장 많았습니다.



35~54세의 Staten Island 주민들은 과다 복용으로 인한 사망률이 가장 높았습니다.



백인 Staten Island 주민들은 과다 복용으로 인한 사망자 수가 가장 많았습니다.



흑인 Staten Island 주민들은 과다 복용으로 인한 사망률이 가장 높았습니다.



약물 과다 복용으로 인한 사망과 관련된 약물(과다 복용으로 인한 사망에는 두 가지 이상의 약물이 포함될 수 있음):



출처: 2022년 뉴욕시 수석 법의관실(Office of the Chief Medical Examiner)과 뉴욕시 보건 및 정신 위생국(Department of Health and Mental Hygiene)의 인구통계국(Bureau of Vital Statistics)의 데이터를 참조하였습니다. 알코올, 약물 사용, 예방, 관리 및 치료 부서별 분석. 2022년 자료는 잠정치이며 변경될 수 있습니다.

