


# 백인 뉴욕 주민들의 약물 과용 사망, 2021년도


**763명이** 백인 뉴욕 주민들이 약물 과용으로 사망하였습니다.

**36.2명이** 백인 뉴욕 주민 100,000명 당 약물 과용으로 사망하였습니다.


백인 뉴욕 주민들의 약물 과용 사망이 3번째로 가장 높습니다.




백인 뉴욕 주민들의 약물 과용 사망률이 3번째로 가장 높습니다.




백인 뉴욕 주민들 중 약물 과용 사망률이 가장 높은 층은 남성이며 35세~54세였습니다.




백인 주민 중 약물 과용 사망이 가장 높은 지역은 Brooklyn이었습니다.



백인 주민 중 약물 과용 사망률이 가장 높은 지역은 Bronx였습니다.



백인 뉴욕 주민들의 약물 과용 사망과 관련된 물질 (약물 과용 사망의 원인은 한 가지 이상의 물질일 수 있습니다):



출처: 약물 과용 사망률 데이터는 15세~84세로 제한되었으며 출처는 2021년도 뉴욕시 수석 검시국(New York City Office of the Chief Medical Examiner) 및 뉴욕시 보건 및 정신위생부 산하 인구통계국(New York City Department of Health and Mental Hygiene's Bureau of Vital Statistics)입니다. 분석 기관: 알코올, 약물 사용, 예방, 관리 및 치료국(Bureau of Alcohol, Drug Use, Prevention, Care and Treatment). 2021년 데이터는 잠정적인 것으로 변경될 수 있습니다.

