



Envie de badiner un peu ?

Empêchez la propagation de la diarrhée pendant vos jeux sexuels anaux.

Appelez le 311 ou **consultez le site nyc.gov/health/clinics** pour savoir où vous faire vacciner contre l'hépatite A à moindres frais ou gratuitement.

Si vous présentez des symptômes, adressez-vous à votre médecin. Pour obtenir davantage d'informations, consultez le verso de cette carte.

Les infections diarrhéiques peuvent se propager lors des relations sexuelles entre deux hommes.

Les jeux anaux, comme le toucher, le contact bouche anus, le fist-fucking, l'utilisation de gadgets sexuels et la pénétration anale peuvent provoquer une infection diarrhéique.

Tout contact avec les excréments peut entraîner des infections comme l'amibiase, la cryptosporidiose, la giardiase, l'hépatite A et la shigellose.

Soyez attentif à l'apparition de symptômes, tels que :

- + Diarrhée
- + Crampes d'estomac ou ballonnements
- + Fièvre
- + Nausées
- + Jaunissement de la peau ou des yeux
(la jaunisse est un signe d'une infection par l'hépatite A)

Appelez le 311 ou **consultez le site nyc.gov/health/clinics** pour savoir où vous faire vacciner contre l'hépatite A à moindres frais ou gratuitement.

French

Comment puis-je me protéger ?

- + Si vous avez souffert de diarrhée, attendez deux semaines avant d'avoir des relations sexuelles.
- + Avant et après chaque relation sexuelle, lavez-vous les mains, le pénis et les fesses avec de l'eau et du savon. N'oubliez pas de laver aussi vos gadgets sexuels.
- + Faites-vous vacciner contre l'hépatite A.
- + Si vous présentez des symptômes, adressez-vous à votre médecin ou rendez-vous dans un établissement de soins d'urgence.

NYC
Health