



Ti piacciono i giochi di lingua?

**Tieni a freno la
diarrea durante la
stimolazione anale.**

Chiama il 311 o visita il sito
nyc.gov/health/clinics per scoprire dove
puoi ricevere un vaccino anti-epatite A a
titolo gratuito o a basso costo.

In presenza di sintomi, rivolgiti a un medico.
Per maggiori informazioni, consulta il retro di
questa scheda informativa.

NYC
Health

Le infezioni da diarrea possono diffondersi in occasione di rapporti sessuali tra uomini.

Praticare rimming, fisting o la stimolazione anale con le dita o con l'uso di sex toy può portare allo sviluppo di infezioni da diarrea.

Venendo a contatto con le feci è possibile contrarre infezioni come l'amebiasi, la criptosporidiosi, la giardiasi, l'epatite A e la dissenteria bacillare.

Ecco alcuni dei principali sintomi:

- + Diarrea
- + Gonfiore di stomaco o crampi addominali
- + Febbre
- + Nausea
- + Ingiallimento della pelle o dei bulbi oculari (ovvero itterizia, uno dei sintomi di un'infezione da epatite A)

Chiama il 311 o **visita il sito nyc.gov/health/clinics** per scoprire dove puoi ricevere un vaccino anti-epatite A a titolo gratuito o a basso costo.

Italian

Come posso proteggermi?

- + Evita i rapporti sessuali per almeno due settimane da quando non hai più sintomi di diarrea.
- + Lava accuratamente con acqua e sapone le mani, il pene, l'ano e i sex toy prima e dopo ogni rapporto sessuale.
- + Vaccinati contro l'epatite A.
- + In presenza di sintomi, rivolgiti al tuo medico o recati al pronto soccorso.

NYC
Health