



항문 성교를 즐기시나요?

항문 성교 중 설사성 감염에
걸리지 않게 조심하세요.

311로 전화하거나 nyc.gov/health/clinics를
방문하여 저비용이나 무료로 A형 간염 백신을
접종받을 수 있는 곳을 확인하세요.

증상이 있는 경우 의사와 상담하세요. 자세한
정보는 뒷면에서 확인하시기 바랍니다.

NYC[™]
Health

남성과 성관계를 갖는 남성은 성관계로 감염성 설사에 전염될 수 있습니다.

손가락, 항문 자극, 손 넣기와 같은 항문 성행위 전회, 항문 성교용 토이 사용 및 항문 성교는 설사성 감염으로 이어질 수 있습니다.

어떤 방식으로든 대변 접촉이 발생하면 아메바성 감염, 와포자충증, 편모충증, A형 간염, 세균성 이질에 감염될 수 있습니다.

다음 증상에 유의하세요.

- + 설사
- + 위경련 또는 팽만감
- + 발열
- + 메스꺼움
- + 피부나 눈이 노랗게 변하는 증상
(황달, A형 간염 감염 신호)

스스로를 지키는 방법

- + 설사가 있다면 성관계는 2주간 피합니다.
- + 성관계를 맺기 전후에 비누와 물로 손, 성기, 엉덩이, 성교용 토이를 깨끗이 닦습니다.
- + A형 간염 백신을 접종받습니다.
- + 증상이 있다면, 의사와 상담하거나 응급 진료 시설을 방문하시기 바랍니다.

311로 전화하거나 nyc.gov/health/clinics를 방문하여 저비용이나 무료로 A형 간염 백신을 접종받을 수 있는 곳을 확인하세요.