

# 軟性下疳

軟性下疳是一種透過陰道性交、肛交和口交傳播的細菌性感染。該病在紐約市內極少發生。

## 症狀

軟性下疳可導致生殖器官疼痛。出現紅色水泡時，即開始疼痛，水泡會擴散，並導致疼痛和流血。

其他症狀可包括：

- 排尿時疼痛
- 性交時疼痛或出血
- 排便時疼痛或出血
- 腹股溝的淋巴結疼痛腫脹



# 軟性下疳



## 預防

避孕套和牙齒隔離障可以預防軟性下疳的傳播，但僅限於它們遮蓋感染區域（疼痛區域）的情況下。

## 檢測

健康照護提供者將使用拭子從疼痛區採集液體樣本。

## 治療

軟性下疳可使用抗生素治療。需要採取全面治療以清除感染，因此重要的是，即使在您感到好轉時，也要服用所有藥物。

## 治療理由

若不治療，軟性下疳可導致任一疼痛區域的嚴重損壞，例如：皮膚、生殖器或直腸。患有軟性下疳則更易染上或傳播 HIV。

## 性伴侶

您的性伴侶也需要接受治療，以確保他們不會患上嚴重疾病，再次感染您或他人。您應將您的感染情況告知過去 10 日內的所有性伴侶，使其能夠接受檢查和治療。

## 軟性下疳 和妊娠

我們尚不知曉軟性下疳是否可給妊娠人群的寶寶造成任何嚴重影響。但您在治療軟性下疳時，仍應告知您的健康照護提供者您已經懷孕。

紐約市性健康診所提供機密且免費或廉價服務，包括 STI 和 HIV 檢測。

如需查找一家診所，請造訪：  
[nyc.gov/health/clinics](https://nyc.gov/health/clinics)。