

软性下疳

软性下疳是一种通过阴道性交、肛交和口交传播的细菌性感染。该病在纽约市内极少发生。

症状

软性下疳可导致生殖器官疼痛。出现红色水泡时,即开始疼痛,水泡会扩散,并导致疼痛和流血。

其他症状可包括:

- 排尿时疼痛
- 性交时疼痛或出血
- 排便时疼痛或出血
- 腹股沟的淋巴结疼痛肿胀



软性下疳



预防

避孕套和牙齿隔离障可以预防软性下疳的传播,但仅限于它们遮盖感染区域(疼痛区域)的情况下。

检测

医疗保健提供者将使用拭子从疼痛区采集液体样本。

治疗

软性下疳可使用抗生素治疗。需要采取全面治疗以清除感染,因此重要的是,即使在您感到好转时,也要服用所有药物。

治疗理由

若不治疗,软性下疳可导致任一疼痛区域的严重损坏,例如:皮肤、生殖器或直肠。患有软性下疳则更易感染上或传播 HIV。

性伴侣

您的性伴侣也需要接受治疗,以确保他们不会患上严重疾病,再次感染您或他人。您应将您的感染情况告知过去 10 日内的所有性伴侣,使其能够接受检查和治疗。

软性下疳 和妊娠

我们尚不知晓软性下疳可给妊娠人群的宝宝造成的任何严重影响。但您在治疗软性下疳时,仍应告知您的医疗保健提供者您已经怀孕。

纽约市性健康诊所提供机密且免费或廉价服务,包括 STI 和 HIV 检测。

如需查找一家诊所,请访问:
nyc.gov/health/clinics。