

於急診室開鴉片類 鎮痛處方藥須知

有時候某些人會濫用鴉片類鎮痛藥，如不按處方規定的方式服藥，或服用他人的處方藥。在紐約市，用藥過量致死者有四分之一涉及使用鴉片類鎮痛藥。我們的急診室只會提供安全、適當的鎮痛方式。

爲了您的安全，我們不會：

* 開長效鴉片類鎮痛處方藥。

如經考酮(OxyContin®)、嗎啡(MSContin®)、芬太尼貼劑(Duragesic®)或美沙酮。

* 開一次以上的短期鴉片類鎮痛藥。

多數情況下為3天劑量。

* 補充遺失、遭竊或損毀的處方藥。



鴉片類鎮痛處方藥可能和非法藥物一樣危險。

- 鴉片類鎮痛藥可造成意識混亂，使人昏昏欲睡，或增加對疼痛的敏感度。
- 人們可能會對鴉片類鎮痛藥產生依賴或上癮。
- 過量服用鴉片類鎮痛藥可能會使人停止呼吸和死亡。



請把您的鴉片類鎮痛處方藥存放在安全的地方！

- 請將鴉片類鎮痛藥放在貼有原本標籤的瓶子裏。
- 請將鴉片類鎮痛藥保存在兒童看不見、接觸不到的地方，最好鎖在櫥櫃內或放在高處的架子上。
- 請在廁所馬桶裏沖掉不再使用的鴉片類鎮痛藥。

對鎮痛藥有問題嗎？

我們可以提供幫助 —— 請撥打1-877-990-8585。

NYC
Health

