

아이소니아지드 및 리파펜틴에 대한 흔한 질문

나의 결핵 감염 치료

귀하의 의료 제공자가 결핵 (tuberculosis, TB) 감염 치료를 위해 **아이소니아지드 및 리파펜틴**을 처방하였습니다. **이 약은 식후 5~10분 내 12주 동안 일주일 1회** 복용하여야 합니다. 아이소니아지드 및 리파펜틴은 향후에 더 심각한 질병인 활동성 결핵 질병 예방을 도울 수 있습니다.

제 결핵 검사가 양성이지만, 흉부 엑스레이는 정상입니다. 컨디션도 좋습니다. 아이소니아지드 및 리파펜틴을 복용해야 하나요?

예. 지금 아프지 않아도, 결핵균이 체내 있습니다. 체내 결핵균을 죽이는 유일한 방법은 약물 복용입니다.

아이소니아지드 및 리파펜틴은 부작용은 무엇입니까?

대부분의 사람들은 문제 없이 이 약을 복용할 수 있습니다.

리파펜틴은 소변 (오줌), 타액 (침), 눈물 또는 땀이 주황색을 띠는 빨간색으로 변하게 할 수 있습니다. 이는 정상입니다. 이 색은 시간이 지나며 없어질 수 있습니다.

기타 약, 한약, 비타민 또는 보충제를 계속 복용해도 됩니까?

무엇인지에 따라 다릅니다. 일부 약, 비타민 및 보충제는 리파펜틴과 복용해도 안전합니다. 일부는 안전하지 않습니다. 일반 의약품, 처방약 (피임약 포함), 한약, 전통 약, 비타민 또는 보충제를 포함하여 복용하시는 기타 약물에 대해 귀하의 의료 제공자, 간호사 또는 약사에게 말씀하십시오.

리파펜틴을 복용하는 동안 피해야 하는 식품이나 음료가 있습니까?

예. 12주의 치료 동안 알코올을 음주하지 마십시오. 알코올과 아이소니아지드 및 리파펜틴을 혼합하면 간을 손상시킬 수 있습니다.

숙성된 치즈, 생선, 염지 또는 훈제 고기와 같은 화학적 티라민 또는 히스타민을 함유한 식품은 피해야 합니다. 이들은 피부 홍조, 빠르거나 두근거리는 심장 박동, 혈압 상승 또는 두통과 같은 증상을 유발할 수 있습니다. 특별한 식이 요법이 필요한지 의사에게 문의하십시오.



다음과 같은 부작용이 있으신 경우 아이소니아지드 및 리파펜틴 복용을 중단하시고 귀하의 의료 제공자 사무실에 바로 전화하십시오.

- 음식을 전혀 먹고 싶지 않은 경우
- 구역질 또는 구토
- 복통
- (빨간색 또는 주황색이 아닌) 갈색 소변 (오줌)
- 밝은 색의 대변 (변/똥)
- 설사
- 하단 흉부 통증 또는 속쓰림
- 발열 유무와 동반한 독감과 같은 증세
- 두통 또는 몸살
- 심각하게 힘이 없거나 피로한 것
- 발열 또는 오한
- 어지러움
- 피부 또는 눈이 노래지는 현상
- 피부 발진 또는 가려움
- 쉽게 멍이 들거나, 설명할 수 없는 빨간색 또는 보라색 점
- 쉽게 일어나는 출혈, 코피 또는 잇몸 또는 치아 주변 출혈
- 숨 가쁨
- 손, 팔, 발 또는 다리의 통증 또는 저림
- 슬픔 또는 우울증

부작용이 심하신 경우, 결핵 감염을 치료하기 위해 다른 약을 복용할 수도 있습니다. 우려 사항이 있으신 경우 귀하의 의료 제공자, 간호사 또는 약사에게 얘기하십시오.

아이소니아지드 및 리파펜틴에 대한 흔한 질문

나의 결핵 감염 치료

약물 복용을 잊어버린 경우 어떻게 합니까?

아직 똑같은 주인 경우 기억나는 대로 지침에 따라 약을 바로 복용하십시오. 한 주를 빼먹으면, 지침에 따라 계속해서 약을 복용하십시오. 약물 복용을 잊은 경우 의료 제공자에게 전화하여 안내 받으십시오.

어떻게 약을 복용하는 것을 기억할 수 있습니까?

약을 일주일에 1회 복용하십시오 (예를 들어, 아침 식사와 함께 매주 월요일). 약물을 추적하는 데는 여러 방법이 있습니다.

- ✓ 결핵 감염 약물 추적지와 같이 약물 일지를 사용하여 어떻게 언제 약을 복용하였는지 기록하십시오.
- ✓ 귀하의 핸드폰이나 컴퓨터의 달력 어플리케이션(앱)을 사용하여 어떻게 언제 약을 복용하였는지 기록하십시오.
- ✓ 약 복용을 위해 일간 알람을 설정하십시오.
- ✓ 침대 역 탁자와 같이 약을 항상 똑같은 곳에 보관하십시오.
- ✓ 주간 알약 용기를 사용하십시오.
- ✓ 친구나 가족 일원에게 약을 복용하는 것을 상기시켜달라고 하십시오.

아이소니아지드 및 리파펜틴을 어떻게 보관해야 합니까?

아이소니아지드 및 리파펜틴을 상온에 보관하십시오. 매우 추울 수 있는 곳(냉장고 등), 매우 뜨거워질 수 있는 곳(렌지 근처 등) 또는 매우 습해질 수 있는 곳(욕실 캐비닛 등)에 리파펜틴을 보관하지 마십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 추가 정보는 nyc.gov/health를 방문하여 "medicine safety"(약물 안전성)를 검색하십시오.

아이소니아지드 및 리파펜틴을 한 번에 30일 이상을 처방받을 수 있습니까?

귀하의 의료 제공자는 아이소니아지드 및 리파펜틴 복용 중 치료가 효과가 있는지와 부작용에 대해 협의하기 위해 매달마다 진료를 하게 될 확률이 높습니다. 귀하와 의료 제공자는 함께 무엇이 최선인지 정할 수 있습니다.

건강하다고 느끼면 약 복용을 중단해도 됩니까? 치료를 일찍 중단해도 됩니까?

아니요. 체내 결핵균을 죽일 확률을 높이기 위해서는 모든 결핵 감염 약물 복용을 마치는 것이 중요합니다. 치료를 일찍 멈추는 경우, 나중에 질병이 발생할 수도 있습니다. 치료를 멈추거나 약을 덜 복용하기 전 의료 제공자와 먼저 상담하십시오.

언제 아이소니아지드 및 리파펜틴을 중단할 수 있습니까?

완전히 12주 치료를 완료한 후에 가능합니다. 약을 복용하는 데 어려움을 겪고 계시는 경우 치료 완료를 도울 수 있도록 의료 제공자에게 말씀하십시오.

귀하의 결핵 감염 치료에 대해 질문이나 우려가 있는 경우 귀하의 의료 제공자에게 꼭 말씀하십시오. 응급 상황이거나 부작용이 더 심해질 경우, 귀하의 의료 제공자에게 연락하거나 가장 근접한 응급실을 방문하십시오.

제공자/클리닉 연락처

제공자/클리닉명:

전화번호:

주소: