

Preguntas comunes sobre la isoniacida y la rifapentina

Mi tratamiento para la infección por tuberculosis

Su proveedor de atención de salud le recetó **isoniacida y rifapentina** para tratar la infección por tuberculosis (TB). **Este medicamento debe tomarse una vez por semana durante 12 semanas**, entre 5 y 10 minutos después de comer. La isoniacida y la rifapentina pueden evitar que contraiga la enfermedad activa de tuberculosis, una enfermedad más grave, en el futuro.

El resultado de mi prueba de detección de tuberculosis fue positivo, pero mi radiografía de tórax es normal. Me siento bien. ¿Necesito empezar a tomar isoniacida y rifapentina?

Sí. Incluso si no se siente enfermo en este momento, tiene gérmenes de la tuberculosis en su cuerpo. Tomar medicamentos es la única manera de eliminar los gérmenes de la tuberculosis en su cuerpo.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la isoniacida y la rifapentina?

La mayoría de las personas pueden tomar estos medicamentos sin ningún problema. La rifapentina puede hacer que la orina (pis), la saliva (baba), las lágrimas o el sudor se vuelvan de color rojo anaranjado. Esto es normal. El color se irá con el tiempo.

¿Puedo seguir tomando mis otros medicamentos, productos herbales, vitaminas o suplementos?

Depende. Algunos medicamentos, vitaminas y suplementos pueden tomarse sin problemas con la isoniacida y la rifapentina. Algunos no son seguros. Informe a su proveedor, enfermero o farmacéutico acerca de otros medicamentos que toma, incluidos medicamentos de venta libre, medicamentos recetados (incluidos los anticonceptivos), medicamentos a base de hierbas, medicamentos tradicionales, vitaminas y suplementos.

¿Hay algún alimento o bebida que deba evitar mientras tomo isoniacida y rifapentina?

Sí. No beba alcohol durante las 12 semanas de tratamiento. La combinación de alcohol con isoniacida y rifapentina puede dañar su hígado.

Se deben evitar los alimentos que contienen tiramina o histamina químicas, como el queso añejo, el pescado y la carne curada o ahumada. Estos pueden causar síntomas, tales como enrojecimiento de la piel, latidos cardíacos rápidos o fuertes, aumento de la presión arterial o dolor de cabeza. Hable con su proveedor para saber si necesita llevar una dieta especial.



Deje de tomar isoniacida y rifapentina y llame al consultorio de su proveedor de inmediato si tiene alguno de los siguientes efectos secundarios:

- No desear comer ningún alimento
- Náuseas o vómitos
- Dolor de estómago
- Orina (pis) marrón (ni roja ni naranja)
- Heces (excremento/popó) de color claro
- Diarrea
- Dolor en la parte inferior del pecho o acidez estomacal
- Síntomas similares a los de la gripe con o sin fiebre
- Dolores de cabeza o en el cuerpo
- Debilidad o cansancio intensos
- Fiebre o escalofríos
- Mareos
- Piel u ojos que se vuelven amarillos
- Erupción cutánea o picazón
- Aparición fácil de moretones o manchas rojas o púrpuras en la piel que no puede explicar
- Sangrado fácil, hemorragias nasales o sangrado de las encías o alrededor de los dientes
- Dificultad para respirar
- Dolor u hormigueo en las manos, brazos, pies o piernas
- Sentimientos de tristeza o depresión

Si tiene efectos secundarios graves, es posible que pueda tomar un medicamento diferente para tratar la infección por tuberculosis. Hable con su proveedor, enfermero o farmacéutico si tiene alguna inquietud.

Preguntas comunes sobre la isoniacida y la rifapentina

Mi tratamiento para la infección por tuberculosis

¿Qué debo hacer si olvido tomar el medicamento?

Si todavía es la misma semana, tome el medicamento según las indicaciones en cuanto se acuerde. Si ha pasado una semana, continúe tomando el medicamento según las indicaciones. Si olvida tomar su medicamento, llame a su proveedor para obtener orientación.

¿Cómo puedo acordarme de tomar el medicamento?

Tome el medicamento una vez por semana (por ejemplo, todos los lunes con el desayuno). Hay diferentes maneras de hacer un seguimiento de su medicamento:

- ✓ Use una hoja de registro de medicamentos, como el registro de medicamentos para la infección por tuberculosis, para realizar un seguimiento de cómo y cuándo toma el medicamento.
- ✓ Use una aplicación (app) de calendario en su teléfono celular o computadora para realizar un seguimiento de cómo y cuándo toma el medicamento.
- ✓ Establezca una alarma diaria para tomar el medicamento.
- ✓ Siempre guarde el medicamento en el mismo lugar, por ejemplo, en la mesita de noche.
- ✓ Use un pastillero semanal.
- ✓ Pídale a un amigo o familiar que le recuerde que debe tomar el medicamento.

¿Cómo debo almacenar la isoniacida y la rifapentina?

Guarde la isoniacida y la rifapentina a temperatura ambiente. No guarde estos medicamentos en un lugar muy frío (como en el refrigerador), muy caliente (como cerca de una estufa) o muy húmedo (como en el gabinete del baño). Mantenga el medicamento fuera del alcance de los niños. Para obtener más información, visite nyc.gov/health y busque "medicine safety" (seguridad de los medicamentos).

¿Se puede surtir mi receta de isoniacida y rifapentina para más de 30 días a la vez?

Lo más probable es que su proveedor quiera verlo todos los meses mientras toma isoniacida y rifapentina para asegurarse de que el tratamiento esté funcionando y analizar cualquier efecto secundario. Juntos, usted y su proveedor pueden decidir qué funcionará mejor.

¿Puedo tomar menos cantidad del medicamento si me siento saludable? ¿Puedo suspender el tratamiento antes de tiempo?

No. Es importante terminar de tomar todos los medicamentos contra la infección por tuberculosis para tener mayores probabilidades de eliminar los gérmenes de la tuberculosis en su cuerpo. Si interrumpe el tratamiento antes de tiempo, podría enfermarse más adelante. Hable primero con su proveedor antes de suspender el tratamiento o tomar una cantidad menor a la indicada.

¿Cuándo puedo dejar de tomar la isoniacida y la rifapentina?

Después de completar todo el tratamiento de 12 semanas. Si tiene dificultades para tomar el medicamento, hable con su proveedor para que lo ayude a completar el tratamiento.

Hable con su proveedor si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el tratamiento contra la infección por tuberculosis. En caso de emergencia o si los efectos secundarios empeoran, comuníquese con su proveedor o acuda a la sala de emergencias más cercana.

Información de contacto del proveedor/clínica

Nombre del proveedor/clínica:

Número de teléfono:

Dirección:
