

Поширені запитання про ізоніазид та рифапентин

Лікування моєї туберкульозної інфекції

Ваш постачальник медичних послуг призначив вам **ізоніазид і рифапентин** для лікування туберкульозної інфекції (tuberculosis, TB). **Ці ліки необхідно приймати один раз на тиждень протягом 12 тижнів**, через 5-10 хвилин після їжі. Ізоніазид і рифапентин можуть запобігти переходу захворювання в активну форму туберкульозу, більш серйозну хворобу, в майбутньому.

У мене позитивний тест на туберкульоз, але рентген грудної клітки в нормі. Я почуваюся добре. Чи потрібно починати приймати ізоніазид і рифапентин?

Так. Навіть якщо зараз ви не відчуваєтеся хворим, у вашому організмі є бактерії туберкульозу. Прийом ліків — єдиний спосіб знищити бактерії туберкульозу у вашому організмі.

Які побічні ефекти ізоніазиду та рифапентину?

Більшість людей приймають ці ліки без жодних проблем. Рифапентин може призвести до того, що ваша сеча, слина, слюзи або піт змінять колір на оранжево-червоний. Це нормально. З часом це забарвлення може пройти.

Чи можу я продовжувати приймати інші ліки, рослинні препарати, вітаміни або добавки?

Це залежить від препарату. Деякі ліки, вітаміни та добавки можна безпечно приймати з ізоніазидом і рифапентином. Деякі приймати небезпечно. Повідомте свого лікаря, медсестру або фармацевта про інші ліки, які ви приймаєте, включно з безрецептурними, рецептурними препаратами (зокрема протизаплідними), рослинними препаратами, народними засобами, вітамінами та добавками.

Чи є якісь продукти або напої, яких мені слід уникати під час прийому ізоніазиду та рифапентину?

Так. Не вживайте алкоголь протягом 12 тижнів лікування. Поєднання алкоголю з ізоніазидом і рифапентином може пошкодити вашу печінку.

Слід уникати продуктів, які містять хімічну речовину тирамін або гістамін, як-от витриманий сир, риба, в'ялене або копчене м'ясо. Вони можуть викликати симптоми, як-от почервоніння шкіри, прискорене серцебиття, підвищення артеріального тиску або головний біль. Поговоріть зі своїм лікарем, щоб дізнатися, чи потрібна вам спеціальна дієта.



Припиніть прийом ізоніазиду та рифапентину й негайно зателефонуйте до офісу вашого постачальника послуг, якщо у вас виникли будь-які з вказаних нижче побічних ефектів:

- Відсутність бажання їсти будь-яку їжу
- Нудота або блювання
- Біль у животі
- Сеча коричневого кольору (не червоного або оранжевого)
- Випорожнення (кал) світлого кольору
- Діарея
- Біль у нижній частині грудей або печія
- Гриппоподібні симптоми з лихоманкою або без неї
- Головний біль або ломота в тілі
- Сильна слабкість або втома
- Лихоманка або озноб
- Запаморочення
- Пожовтіння шкіри або очей
- Висип на шкірі або свербіж
- Легка поява синців, червоних або фіолетових плям на шкірі, і ви не знаєте, звідки вони взялися
- Легка поява кровотечі, носової кровотечі або кровотечі з ясен чи навколо зубів
- Задишка
- Біль або поколювання в кистях, руках, ступнях або ногах
- Почуття смутку або депресії

Якщо у вас серйозні побічні ефекти, можливо, ви прийматимете інший препарат для лікування туберкульозної інфекції. Поговоріть зі своїм лікарем, медсестрою або фармацевтом, якщо у вас є якісь побоювання.

Поширені запитання про ізоніазид та рифапентин

Лікування моєї туберкульозної інфекції

Що робити, якщо я забув прийняти ліки?

Якщо це той самий тиждень, прийміть ліки за інструкцією, щойно згадаєте.
Якщо ви пропустили тиждень, продовжуйте приймати ліки згідно з інструкцією.
Якщо ви забули прийняти ліки, зателефонуйте своєму постачальнику послуг (лікареві) для отримання рекомендацій.

Як не забувати приймати ліки?

Приймайте ліки раз на тиждень (наприклад, щопонеділка під час сніданку).

Є різні способи відстежування прийому ліків:

- ✓ Використовуйте журнал обліку прийому ліків, наприклад, форму для відстеження прийому препаратів від туберкульозної інфекції, щоб стежити за тим, як і коли ви приймаєте ліки.
- ✓ Використовуйте додаток – календар – на вашому мобільному телефоні або комп'ютері, щоб стежити за тим, як і коли ви приймаєте ліки.
- ✓ Встановлюйте щоденне нагадування про прийом ліків.
- ✓ Завжди тримайте ліки в тому самому місці, наприклад, на тумбочці біля ліжка.
- ✓ Використовуйте таблетницю.
- ✓ Попросіть друга або члена сім'ї нагадувати вам про прийом ліків.

Як зберігати ізоніазид і рифапентин?

Зберігайте ізоніазид і рифапентин за кімнатної температури. Не зберігайте ці ліки в місці, де дуже холодно (наприклад, у холодильнику), дуже спекотно (наприклад, біля плити) або дуже волого (наприклад, у шафі у ванній кімнаті). Тримайте їх в недоступному для дітей місці. Для отримання додаткової інформації відвідайте вебсайт nyc.gov/health та знайдіть інформацію про «**medicine safety**» (безпеку ліків).

Чи можна отримати рецепт на ізоніазид і рифапентин більше, ніж на 30 днів?

Ваш лікар, найімовірніше, захоче бачити вас щомісяця, доки ви приймаєте ізоніазид і рифапентин, щоб переконатися в ефективності лікування й обговорити будь-які побічні ефекти. Разом ви та ваш лікар можете вирішити, який варіант буде найкращим для вас.

Чи можу я приймати менше ліків, якщо почуваюся здоровим?

Чи можу я припинити лікування раніше?

Ні. Важливо закінчити прийом усіх ліків проти туберкульозу, щоб упевнитися, що мікроби туберкульозу у вашому організмі знищено. Якщо ви припините лікування раніше, ви можете захворіти пізніше. Перш ніж припинити лікування або приймати меншу кількість ліків, спочатку поговоріть зі своїм лікарем.

Коли я можу припинити прийом ізоніазиду та рифапентину?

Після того, як ви пройдете весь 12-тижневий курс лікування. Якщо у вас виникають проблеми з прийомом ліків, зверніться до свого лікаря, щоб він допоміг вам завершити курс лікування.

Зверніться до свого лікаря, якщо у вас виникли запитання або сумніви щодо лікування вашої туберкульозної інфекції. В екстрених випадках або якщо побічні ефекти посилюються, зв'яжіться з вашим постачальником послуг (лікарем) або зверніться до найближчого пункту невідкладної допомоги.

Контактна інформація постачальника послуг/клініки

ПІБ постачальника/Назва клініки:

Номер телефону:

Адреса:
