

Często zadawane pytania na temat **ryfampicyny** Leczenie zakażenia gruźlicą

Twój lekarz przepisał Ci ryfampicynę w celu leczenia zakażenia gruźlicą (tuberculosis, TB). Lek ten należy przyjmować codziennie przez cztery miesiące. Ryfampicyna może pomóc zapobiec wystąpieniu w przyszłości aktywnej gruźlicy będącej poważniejszą chorobą.

Mam dodatni wynik badania w kierunku gruźlicy, ale moje wyniki prześwietlenia płuc są w normie. Nie czuję się chory(-a). Czy muszę rozpocząć leczenie ryfampicyną?

Tak. Nawet jeśli nie czujesz się chory(-a) teraz, w Twoim organizmie są bakterie gruźlicy. Jedynym sposobem na zabicie bakterii gruźlicy w twoim organizmie jest przyjęcie leków.

Jakie są skutki uboczne ryfampicyny?

Większość osób może przyjmować ten lek bez żadnych problemów. Ryfampicyna może powodować pomarańczowo-czerwone zabarwienie moczu, śliny, łez lub potu. Jest to normalne. Zabarwienie może z czasem ustępować.

Czy mogę nadal przyjmować inne leki, leki ziołowe, witaminy i suplementy diety?

To zależy. Niektóre leki, witaminy i suplementy diety można bezpiecznie przyjmować równocześnie z ryfampicyną. Niektóre z nich nie są jednak bezpieczne. Należy poinformować lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę o innych przyjmowanych lekach, w tym lekach wydawanych bez recepty, lekach wydawanych na receptę (w tym środkach antykoncepcyjnych), lekach ziołowych, środkach tradycyjnej medycyny, witaminach i suplementach diety.

Czy należy unikać jakichś pokarmów lub napojów podczas stosowania ryfampicyny?

Tak. Nie należy spożywać alkoholu podczas czterech miesięcy leczenia. Spożywanie alkoholu podczas stosowania ryfampicyny może uszkodzić wątrobę. Nie ma konieczności unikania spożywania określonych pokarmów podczas stosowania ryfampicyny.

Co powinienem/powinnam zrobić, jeśli zapomnę przyjąć lek?

Jeśli dzień się jeszcze nie skończył, przyjmij lek zgodnie z zaleceniami, jak tylko sobie o tym przypomnisz. Jeśli pominiesz jeden dzień, kontynuuj przyjmowanie leku zgodnie z zaleceniami. Jeśli zapomnisz przyjąć lek, zadzwoń do lekarza, aby otrzymać wskazówki.



W przypadku wystąpienia następujących skutków ubocznych należy przerwać stosowanie ryfampicyny, i natychmiast zadzwonić do swojego ośrodka zdrowia.

- Brak apetytu
- Nudności lub wymioty
- Ból brzucha
- Brązowe (nie czerwone lub pomarańczowe) zabarwienie moczu
- Jasny kolor stolca
- Skłonność do powstawania siniaków lub krwawienia
- Wysypka lub świąd skóry
- Żółte zabarwienie skóry lub gałek ocznych
- Ciężkie osłabienie lub zmęczenie
- Gorączka
- Bóle głowy lub mięśni
- Zawroty głowy

W przypadku ciężkiego nasilenia skutków ubocznych może istnieć możliwość stosowania innego leku w celu leczenia zakażenia gruźlicą. W razie wątpliwości należy porozmawiać ze swoim lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

Często zadawane pytania na temat ryfampicyny

Leczenie zakażenia gruźlicą

Co mogę zrobić, aby pamiętać o przyjmowaniu leku?

Przyjmuj lek codziennie o tej samej porze (na przykład, codziennie przed śniadaniem). Istnieją sposoby monitorowania przyjmowania leku:

- ✓ Korzystaj z dzienniczka przyjmowania leku, jak np. Dzienniczek do rejestracji przyjmowania leku na zakażenie gruźlicą, w celu monitorowania, jak i kiedy przyjmujesz lek.
- ✓ Korzystaj z aplikacji kalendarza na telefonie komórkowym lub komputerze w celu monitorowania, jak i kiedy przyjmujesz lek.
- ✓ Ustaw codzienny alarm przypominający o konieczności przyjęcia leku.
- ✓ Zawsze trzymaj lek w tym samym miejscu, jak np. na stoliku nocnym przy łóżku.
- ✓ Korzystaj z tygodniowego pojemnika na leki.
- ✓ Poproś znajomego lub członka rodziny, aby przypomnieli Ci o konieczności przyjęcia leku.

Jak należy przechowywać ryfampicynę?

Ryfampicynę należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Ryfampicyny nie należy przechowywać w miejscu o bardzo niskiej temperaturze (np. w lodówce), o bardzo wysokiej temperaturze (np. w pobliżu kuchenki) lub o dużej wilgotności (np. w szafce łazienkowej). Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Więcej informacji można znaleźć na stronie nyc.gov/health, wyszukując „**medicine safety**” (bezpieczeństwo leków).

Czy mogę jednorazowo wykupić ryfampicynę w ilości, która wystarczy na ponad 30 dni?

Twój lekarz będzie chciał, abyś zgłaszała(a) się na wizytę co miesiąc podczas stosowania ryfampicyny w celu upewnienia się, że leczenie jest skuteczne, oraz w celu omówienia ewentualnych skutków ubocznych. Ty i Twój lekarz wspólnie zdecydujecie, jakie rozwiązanie będzie najlepsze.

Czy mogę przyjmować mniej leku, jeśli będę się czuł(a) zdrowy(-a)? Czy mogę wcześniej zakończyć leczenie?

Nie. Ważne jest, aby przyjąć cały lek stosowany w leczeniu zakażenia gruźlicą, aby możliwe było zabicie wszystkich bakterii gruźlicy w Twoim organizmie. Jeśli wcześniej zakończysz leczenie, możesz później zachorować. Należy skonsultować się z lekarzem przed przerwaniem leczenia lub rozpoczęciem przyjmowania leku w mniejszych ilościach.

Kiedy mogę zakończyć przyjmowanie ryfampicyny?

Po zakończeniu czteromiesięcznego leczenia. W przypadku problemów z przyjmowaniem leku należy skonsultować się ze swoim lekarzem, aby mógł Ci pomóc dokończyć leczenie.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących leczenia zakażenia gruźlicą należy zwrócić się do swojego lekarza. W nagłym wypadku lub w przypadku nasilenia się skutków ubocznych należy skontaktować się ze swoim lekarzem lub udać się do najbliższej izby przyjęć.

Informacje kontaktowe ośrodka zdrowia/lekarza

Nazwa ośrodka zdrowia/imię i nazwisko lekarza:

Numer telefonu:

Adres:
