

Распространенные вопросы о рифампине

Мое лечение от туберкулезной инфекции

Ваш поставщик медицинских услуг прописал вам для лечения от туберкулезной (tuberculosis, TB) инфекции рифампин (Rifampin). Это лекарство следует принимать ежедневно в течение четырех месяцев. Рифампин может помочь вам предотвратить будущее заболевание активным туберкулезом, более серьезной болезнью.

У меня положительный анализ на туберкулез, но нормальная рентгенограмма грудной клетки. Я не чувствую себя больным(ой). Нужно ли мне начинать прием рифампина?

Да. Даже если сейчас вы не чувствуете себя плохо, в вашем организме есть микробы туберкулеза. Прием лекарства — единственный способ убить микробы туберкулеза в вашем организме.

Каковы побочные эффекты рифампина?

Большинство людей могут принимать это лекарство без каких бы то ни было проблем. Рифампин может вызывать оранжево-красный цвет вашей урины (мочи), слюны (плевков), слез или пота. Это нормально. Со временем этот цвет может стать бледнее.

Могу ли я по-прежнему принимать другие лекарства, лечебные травы, витамины или пищевые добавки?

Смотря какие. Некоторые лекарства, витамины и пищевые добавки безопасно принимать вместе с рифампином. Некоторые — небезопасно. Расскажите своему врачу, медсестре или фармацевту о других лекарствах, которые вы принимаете, в том числе безрецептурных лекарствах, рецептурных лекарствах (в том числе противозачаточных), лечебных травах, средствах традиционной медицины, витаминах и пищевых добавках.

Есть ли какие-нибудь продукты или напитки, которых мне следует избегать во время приема рифампина?

Да. Не пейте алкогольных напитков в течение четырех месяцев лечения. Сочетание алкоголя с рифампином может повредить вашей печени. Насколько известно, продуктов, которых следует избегать во время приема рифампина, не существует.

Что делать, если я забуду принять лекарство?

Если день еще не закончился, примите лекарство в соответствии с указаниями, как только вспомните о нем. Если вы пропустили день, продолжайте принимать лекарство в соответствии с указаниями. Если вы забываете принимать лекарство, обратитесь за советом к своему поставщику медицинских услуг.



Немедленно прекратите прием рифампина и позвоните в кабинет своего поставщика медицинских услуг, если у вас появятся любые из следующих побочных эффектов:

- Полное отсутствие аппетита
- Тошнота или рвота
- Боль в желудке
- Коричневая (не красная или оранжевая) урина (моча)
- Стул (кал/испражнения) светлого цвета
- Легкое образование синяков или кровотечений
- Сыпь или зуд на коже
- Пожелтение кожи или глаз
- Сильная слабость или усталость
- Жар
- Головные боли или боли в теле
- Головокружение

Если вы испытываете тяжелые побочные эффекты, вы, возможно, сможете принимать другое лекарство для лечения туберкулезной инфекции. Если вас что-либо беспокоит, поговорите со своим поставщиком медицинских услуг, медсестрой или фармацевтом.

Распространенные вопросы о рифампине

Мое лечение от туберкулезной инфекции

Как не забывать принимать лекарство?

Принимайте лекарство в одно и то же время суток (например, каждый день перед завтраком). Есть разные способы отслеживать прием лекарств:

- ✓ Ведите журнал приема лекарств, например, «Дневник приема лекарств от туберкулезной инфекции», отмечая в нем, как и когда вы принимаете свое лекарство.
- ✓ Отмечайте, как и когда вы принимаете свое лекарство, в календарном приложении на своем сотовом телефоне или компьютере.
- ✓ Установите будильник на день и время приема лекарства.
- ✓ Всегда храните лекарство в одном и том же месте, например, на прикроватном столике.
- ✓ Используйте недельную таблетницу.
- ✓ Попросите друзей или родственников напоминать вам о приеме лекарства.

Как хранить рифампин?

Храните рифампин при комнатной температуре. Не храните рифампин там, где может быть очень холодно (например, в холодильнике), очень жарко (например, рядом с плитой) или очень влажно (например, в шкафчике в ванной). Держите его вне досягаемости детей. Для получения дополнительной информации посетите сайт nyc.gov/health и выполните поиск по словам «**medicine safety**» («безопасность лекарств»).

Можно ли сразу получить по моему рецепту рифампин более, чем на 30 дней?

Во время приема рифампина ваш поставщик медицинских услуг, вероятно, захочет встречаться с вами каждый месяц для проверки хода лечения и обсуждения возможных побочных эффектов. Вы сможете выбрать самый удобный вариант вместе с ним.

Могу ли я принимать меньше лекарства, если хорошо себя чувствую? Могу ли я прекратить лечение досрочно?

Нет. Чтобы добиться наибольшей вероятности уничтожения всех туберкулезных микробов в вашем организме, важно завершить прием всех лекарств от туберкулеза. Если вы прекратите лечение раньше срока, вы можете заболеть впоследствии. Перед прекращением лечения или уменьшением дозировки лекарств поговорите со своим поставщиком медицинских услуг.

Когда я могу прекратить прием рифампина?

После полного завершения четырехмесячного курса лечения. Если вам трудно принимать лекарства, поговорите со своим поставщиком медицинских услуг, чтобы он помог вам пройти полный курс лечения.

Если у вас есть вопросы или беспокойство относительно вашего лечения от туберкулезной инфекции, поговорите со своим поставщиком медицинских услуг. В случае возникновения экстренной ситуации или усиления побочных эффектов свяжитесь со своим поставщиком медицинских услуг или обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи.

Контактная информация поставщика медицинских услуг/клиники

Имя/название поставщика/клиники:

Номер телефона:

Адрес:
