

# Preguntas comunes sobre la rifampicina

## Mi tratamiento para la infección por tuberculosis

**Su proveedor de atención de salud le recetó rifampicina (Rifampin) para tratar la infección por tuberculosis (TB). Este medicamento debe tomarse todos los días durante cuatro meses.** La rifampicina puede evitar que contraiga la enfermedad activa de tuberculosis, una enfermedad más grave, en el futuro.

**El resultado de mi prueba de detección de tuberculosis fue positivo, pero mi radiografía de tórax es normal. No me siento enfermo. ¿Necesito empezar a tomar rifampicina?**

Sí. Incluso si no se siente enfermo en este momento, tiene gérmenes de la tuberculosis en su cuerpo. Tomar medicamentos es la única manera de eliminar los gérmenes de la tuberculosis en su cuerpo.

**¿Cuáles son los efectos secundarios de la rifampicina?**

La mayoría de las personas pueden tomar este medicamento sin ningún problema. La rifampicina puede hacer que la orina (pis), la saliva (baba), las lágrimas o el sudor se vuelvan de color rojo anaranjado. Esto es normal. El color se irá con el tiempo.

**¿Puedo seguir tomando mis otros medicamentos, productos herbales, vitaminas o suplementos?**

Depende. Algunos medicamentos, vitaminas y suplementos pueden tomarse sin problemas con la rifampicina. Algunos no son seguros. Informe a su proveedor, enfermero o farmacéutico acerca de otros medicamentos que toma, incluidos medicamentos de venta libre, medicamentos recetados (incluidos los anticonceptivos), medicamentos a base de hierbas, medicamentos tradicionales, vitaminas y suplementos.

**¿Hay algún alimento o bebida que deba evitar mientras tomo rifampicina?**

Sí. No beba alcohol durante sus cuatro meses de tratamiento. La combinación de alcohol con rifampicina puede dañar su hígado. No hay alimentos que se sepa que deben evitarse al tomar rifampicina.

**¿Qué debo hacer si olvido tomar el medicamento?**

Si sigue siendo el mismo día, tome su medicamento según las indicaciones tan pronto como se acuerde. Si pasa un día, continúe tomando su medicamento según las indicaciones. Si olvida tomar su medicamento, llame a su proveedor para obtener orientación.



**Deje de tomar rifampicina y llame al consultorio de su proveedor de inmediato si tiene alguno de los siguientes efectos secundarios:**

- No desear comer ningún alimento
- Náuseas o vómitos
- Dolor de estómago
- Orina (pis) marrón (ni roja ni naranja)
- Heces (excremento/popó) de color claro
- Moretones o sangrado con facilidad
- Erupción cutánea o picazón
- Piel u ojos que se vuelven amarillos
- Debilidad o cansancio intensos
- Fiebre
- Dolores de cabeza o en el cuerpo
- Mareos

Si tiene efectos secundarios graves, es posible que pueda tomar un medicamento diferente para tratar la infección por tuberculosis. Hable con su proveedor, enfermero o farmacéutico si tiene alguna inquietud.

# Preguntas comunes sobre la rifampicina

## Mi tratamiento para la infección por tuberculosis

### ¿Cómo puedo acordarme de tomar el medicamento?

Tome el medicamento a la misma hora todos los días (por ejemplo, todos los días después del desayuno). Hay diferentes maneras de hacer un seguimiento de su medicamento:

- ✓ Use una hoja de registro de medicamentos, como el registro de medicamentos para la infección por tuberculosis, para realizar un seguimiento de cómo y cuándo toma el medicamento.
- ✓ Use una aplicación (app) de calendario en su teléfono celular o computadora para realizar un seguimiento de cómo y cuándo toma el medicamento.
- ✓ Establezca una alarma diaria para tomar el medicamento.
- ✓ Siempre guarde el medicamento en el mismo lugar, por ejemplo, en la mesita de noche.
- ✓ Use un pastillero semanal.
- ✓ Pídale a un amigo o familiar que le recuerde que debe tomar el medicamento.

### ¿Cómo debo guardar la rifampicina?

Guarde la rifampicina a temperatura ambiente. No guarde la rifampicina en un lugar muy frío (como en el refrigerador), muy caliente (como cerca de una estufa) o muy húmedo (como en el gabinete del baño). Mantenga el medicamento fuera del alcance de los niños. Para obtener más información, visite [nyc.gov/health](http://nyc.gov/health) y busque "medicine safety" (seguridad de los medicamentos).

### ¿Se puede surtir mi receta de rifampicina para más de 30 días a la vez?

Lo más probable es que su proveedor quiera verlo todos los meses mientras toma rifampicina para asegurarse de que el tratamiento esté funcionando y analizar cualquier efecto secundario. Juntos, usted y su proveedor pueden decidir qué funcionará mejor.

### ¿Puedo tomar menos cantidad del medicamento si me siento saludable? ¿Puedo suspender el tratamiento antes de tiempo?

No. Es importante terminar de tomar todos los medicamentos contra la infección por tuberculosis para tener mayores probabilidades de eliminar los gérmenes de la tuberculosis en su cuerpo. Si interrumpe el tratamiento antes de tiempo, podría enfermarse más adelante. Hable primero con su proveedor antes de suspender el tratamiento o tomar una cantidad menor a la indicada.

### ¿Cuándo puedo dejar de tomar rifampicina?

Después de completar todo el tratamiento de cuatro meses. Si tiene dificultades para tomar el medicamento, hable con su proveedor para que lo ayude a completar el tratamiento.

Hable con su proveedor si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el tratamiento contra la infección por tuberculosis. En caso de emergencia o si los efectos secundarios empeoran, comuníquese con su proveedor o acuda a la sala de emergencias más cercana.

### Información de contacto del proveedor/clínica

Nombre del proveedor/clínica:

---

---

Número de teléfono:

---

---

Dirección:

---

---