

ЧТО ТАКОЕ ФЕНТАНИЛ?

Фентанил является быстродействующим синтетическим опиоидом. По биологическому воздействию это вещество примерно в 30–50 раз сильнее героина.


Носите с собой налоксон. Налоксон может ослабить воздействие опиоидов, в т. ч. героина и фентанила, при передозировке.

Лекарственный фентанил назначают при сильных болях и терминальных состояниях. Нелекарственный же фентанил изготавливается нелегально. В г. Нью-Йорке были зафиксированы примеси этого опиоида в партиях кокаина, героина, кетамина и метамфетамина. Кроме того, примеси фентанила были обнаружены в нелегально изготовленных бензодиазепинах, таких как алпразолам (Xanax) и клоназепам (Klonopin), а также в опиоидных обезболивающих препаратах, таких как оксикодон (OxyContin) и гидрокодон / парацетамол (Vicodin), продаваемых на улице или через интернет. Фентанил невозможно распознать по виду, вкусу или запаху.

Передозировка фентанилом

Фентанил действует сильнее и быстрее, чем другие опиоиды. Употребление фентанила или фентанилосодержащих препаратов повышает риск передозировки. Риск передозировки еще выше, если фентанил присутствует в неопиоидном наркотике (например, в кокаине), а человек, принимающий его, обычно не употребляет опиоиды.

В случае передозировки фентанилом человеку требуется незамедлительно оказать медицинскую помощь. Если вы стали свидетелем передозировки, позвоните по номеру **911** и введите человеку налоксон, который ослабляет действие опиоидов при передозировке.



Симптомы передозировки опиоидами включают в себя:

- потерю сознания или отсутствие реакции на внешние раздражители;
- замедление или остановку дыхания;
- синюшный, серый или белый цвет губ и ногтей;
- храп или бульканье.

Передозировка фентанилом может сопровождаться дополнительными симптомами, в числе которых:

- скованность, заторможенность движений челюсти, груди, туловища;
- симптомы, подобные эпилептическому припадку, например подергивание конечностей и мышечные спазмы.

- замедленное сердцебиение или аритмия;

Если вы подозреваете, что человек страдает от передозировки опиоидами, очень важно не терять время и незамедлительно ввести ему налоксон.

Рекомендации по предотвращению передозировки

- Если вы употребляете наркотики, то принимайте их вместе с другими людьми по очереди или позаботьтесь о том, чтобы кто-нибудь проверил ваше состояние.
- Проверяйте вещества, которые принимаете. С помощью индикаторных полосок для определения фентанила можно определить, содержится ли в препарате соответствующее вещество.
- Не смешивайте препараты. Смешивание наркотических веществ, включая алкоголь, повышает риск передозировки.
- Употребляйте медленно и в небольших количествах.

Звоните по номеру 888-692-9355, чтобы найти налоксон поблизости.