

¿QUÉ ES EL FENTANILO?

El fentanilo es un opioide sintético de acción rápida entre 30 y 50 veces más potente que la heroína.


Lleve naloxona con usted. La naloxona puede revertir una sobredosis de heroína y otros opioides, como el fentanilo.

El fentanilo farmacéutico se receta para el dolor intenso y la atención al final de la vida. El fentanilo no farmacéutico se produce ilegalmente y se ha encontrado en sustancias como la cocaína, la heroína, la ketamina y la metanfetamina en la ciudad de Nueva York. También se ha encontrado en las benzodiazepinas falsas (como las de Xanax o de Klonopin) y en los analgésicos opioides (como OxyContin o Vicodin) que se compran en la calle o por Internet. El fentanilo no se puede identificar a través de la vista, el gusto ni el olfato.

Sobredosis de fentanilo

El fentanilo es más fuerte y actúa más rápido que otros opioides. Consumir fentanilo o alguna sustancia que contenga fentanilo aumenta el riesgo de sobredosis. Este riesgo es aún mayor si el fentanilo está presente en una droga que no es un opioide (como la cocaína) y la persona que la toma no suele consumir opioides.

Las sobredosis de fentanilo requieren atención médica inmediata. Si presencia una sobredosis, llame al **911** y administre naloxona, un medicamento seguro que puede revertir una sobredosis de opioides.



Las señales de una sobredosis de opioides son:

- Falta de reacción o pérdida de la conciencia
- Uñas o labios azulados, grises o blancos
- Respiración lenta o interrumpida
- Ronquidos o gorgoteo

Las sobredosis con fentanilo también pueden tener otros síntomas, como:

- Mandíbula, pecho o torso duro o rígido
- Síntomas de convulsiones, como sacudidas en las extremidades y espasmos musculares
- Latidos lentos o irregulares

Si sospecha que alguien está teniendo una sobredosis de opioides, es importante actuar rápido y administrarle naloxona de inmediato.

Consejos para la prevención de una sobredosis

- Si consume drogas, hágalo con otras personas y en turnos, o pídale a alguien que esté pendiente de usted.
- Evite mezclar drogas. El consumo de distintas drogas al mismo tiempo, incluyendo el alcohol, aumenta el riesgo de sobredosis.
- Examine sus drogas. Las tiras reactivas de fentanilo pueden indicarle si sus drogas contienen fentanilo.
- Vaya despacio y consuma cantidades pequeñas.

Llame al 888-692-9355 para saber dónde conseguir naloxona cerca de su ubicación.