

## НАЛОКСОН (NARCAN)® — ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА

**Налоксон — это безопасный лекарственный препарат, способный нейтрализовать последствия передозировки опиоидами.**

Препарат действует только на **опиоиды** (такие как героин, фентанил и рецептурные болеутоляющие препараты), и **не приносит вреда** в случае их отсутствия в организме.

**ВАЖНО!** Расскажите близким, где вы храните налоксон, и как его применять.


## ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ПЕРЕДОЗИРОВКИ

**Признаки передозировки опиоидами:**

- Отсутствие реакции или потеря сознания
- Замедленное дыхание или его отсутствие
- Синюшный, серый или бледный оттенок губ либо ногтей
- Храп или булькающие звуки

**Перед применением налоксона проверьте реакцию, выполнив перечисленные ниже действия.**

- Громко крикните пострадавшему в ухо.
- В случае отсутствия реакции несколько раз проведите с усилием костяшками пальцев, по его грудной клетке (растирание грудины).



**Отсутствие реакции на растирание грудины свидетельствует о передозировке и требует неотложных мер помощи.**

## ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПЕРЕДОЗИРОВКИ

1. **Позвоните в службу неотложной медицинской помощи по номеру 911.** Сообщите, что человек не дышит.
2. **Введите налоксон.** НЕ проверяйте работу устройства — им можно воспользоваться только один раз.



Раскройте

Вставьте

Нажмите

Устройство не требует сборки. Впрысните препарат в одну ноздрю, нажав на поршень.


**В случае отсутствия реакции через две минуты введите вторую дозу.**

3. Как можно скорее выполните процедуру искусственного дыхания или сердечно-легочную реанимацию (если умеете). Набор содержит защитную маску.

- Наклоните голову пострадавшего назад и зажмите ему нос.
- Сделайте два выдоха «рот в рот», чтобы грудная клетка пострадавшего приподнялась.
- Продолжайте делать по одному выдоху каждые пять секунд.



4. **Помогите пострадавшему принять устойчивое положение.** Когда вы не вводите налоксон или не выполняете процедуру искусственного дыхания, уложите человека на бок, чтобы он не задохнулся.



## ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОКСОНА

**Не оставляйте пострадавшего одного до прибытия сотрудников неотложной медицинской помощи.**

- Налоксон действует в течение 30–90 минут и может вызывать синдром отмены, пока не будет полностью выведен из организма.
- Прием наркотиков не поможет ликвидировать синдром отмены, но может увеличить риск новой передозировки.

**Сообщите об использовании налоксона представителям программы, которая предоставила его, или воспользуйтесь приложением Stop OD NYC.**

Получите новый комплект, если вы использовали одну или несколько доз налоксона либо если срок его годности истек.

## ПОДДЕРЖКА

Для получения налоксона или поддержки в связи со злоупотреблением наркотическими веществами либо наличием проблем с психическим здоровьем обратитесь в систему NYC Well («Благополучный Нью-Йорк»). Служба работает круглосуточно и без выходных.

 **Позвоните по номеру 888-692-9355**

 **Отправьте текстовое сообщение со словом WELL на номер 65173**

 **Задайте вопросы в онлайн-чате на веб-странице [nyc.gov/nycwell](https://nyc.gov/nycwell)**

Вы также можете обратиться в справочную службу OASAS HOPEline, позвонив по номеру 877-845-7369, отправив текстовое сообщение со словом HOPENY на номер 467369 или посетив веб-страницу [oasas.ny.gov/treatment](https://oasas.ny.gov/treatment)

**NYC**  
Health

**ЧТО ТАКОЕ  
НАЛОКСОН?  
WHAT IS NALOXONE?**



**NYC**  
Health