

НАЗНАЧЕНИЕ ОПИОИДНЫХ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ В ОТДЕЛЕНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ

Иногда люди злоупотребляют опиоидными обезболивающими препаратами, применяя их либо не в соответствии с указанием врача, либо по чужому рецепту. Каждая четвертая смерть от передозировки в городе Нью-Йорке связана с приемом опиоидных обезболивающих препаратов. Наше отделение неотложной помощи будет предоставлять только те варианты обезболивания, которые являются безопасными и обоснованными.

РАДИ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЫ:

*** Не назначаем опиоидные обезболивающие препараты длительного действия.**

К ним относятся: оксикодон (OxyContin®), морфин (MSContin®), фентаниловые пластыри (Duragesic®) или метадон.

*** Не назначаем длительный курс опиоидных обезболивающих препаратов.**

В большинстве случаев это 3-дневный курс.

*** Повторно не выписываем лекарственные препараты по утерянным, украденным или испорченным рецептам.**



Рецептурные опиоидные обезболивающие препараты могут быть так же опасны, как и запрещенные наркотики.

- Опиоидные обезболивающие препараты могут вызвать помрачение сознания, сонливость и повышенную чувствительность к боли.
- От опиоидных обезболивающих препаратов у людей может возникнуть зависимость или аддикция.
- Передозировка опиоидными обезболивающими препаратами может привести к остановке дыхания и к смерти.



Храните свои рецептурные опиоидные обезболивающие препараты в безопасном месте!

- Храните опиоидные обезболивающие препараты в оригинальной упаковке с этикеткой.
- Храните опиоидные обезболивающие препараты в недоступном для детей месте, желательно в закрытом на ключ шкафу или на высокой полке.
- Избавьтесь от опиоидных обезболивающих препаратов, которые вы больше не принимаете, смыв их в унитаз.

У вас проблема с обезболивающими препаратами?

Для получения помощи звоните по телефону 1-800-543-3638

NYC
Health

