

# PRESCRIPCIÓN DE ANALGÉSICOS OPIÁCEOS EN EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS

Algunas veces la gente usa indebidamente los analgésicos opiáceos, ya sea porque los toma de manera distinta a la receta o la receta fue de otra persona. En la Ciudad de Nueva York, una de cada cuatro muertes por sobredosis está relacionada con analgésicos opiáceos. Nuestro Departamento de Emergencias solo ofrecerá opciones para aliviar el dolor que sean seguras y adecuadas.

## PARA SU SEGURIDAD, NO HACEMOS LO SIGUIENTE:

### \* **Recetar analgésicos opiáceos de acción prolongada.**

Por ejemplo, oxicodona (OxyContin®), morfina (MSContin®), parches de fentanilo (Duragesic®) o metadona.

### \* **Recetar un tratamiento de largo plazo con analgésicos opiáceos.**

3 días en la mayoría de los casos.

### \* **Rellenar recetas perdidas, robadas o destruidas.**



#### **Los analgésicos opiáceos recetados pueden ser tan peligrosos como las drogas ilegales.**

- Los analgésicos opiáceos pueden causar confusión, somnolencia y aumento de la sensibilidad al dolor.
- La gente puede llegar a ser dependiente de los analgésicos opiáceos o adicta a estos.
- Una persona puede dejar de respirar y morir por una sobredosis de analgésicos opiáceos.



#### **¡Mantenga sus analgésicos opiáceos recetados en un lugar seguro!**

- Mantenga los analgésicos opiáceos en sus envases originales etiquetados.
- Mantenga los analgésicos opiáceos fuera del alcance de los niños, preferiblemente en un armario bajo llave o sobre un estante alto.
- Para desechar los analgésicos opiáceos que ya no usa, arrójelos por el inodoro.

**¿Tiene problemas de abuso de analgésicos recetados?**

**Hay ayuda disponible – llame al 1-877-AYUDESE**

**NYC**  
Health

