


# الوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة بين سكان مدينة نيويورك من السود، لعام 2022


من سكان مدينة نيويورك من السود من بين كل 100000 من السكان توفوا بسبب تناول جرعة زائدة من العقاقير. **62.0**

سجل سكان مدينة نيويورك السود أعلى معدلات الوفاة الناتجة عن تناول جرعة زائدة (من بين كل 100000 من السكان).




من سكان مدينة نيويورك من السود توفوا بسبب تناول جرعة زائدة من العقاقير. **1032**

سجل سكان مدينة نيويورك من السود ثالث أكبر عدد للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.





كان أعلى معدلات الوفاة الناتجة عن تناول جرعة زائدة بين سكان مدينة نيويورك من السود من نصيب الذكور والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و84 عامًا.




سجلت منطقة Manhattan الإدارية أكبر معدل للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة بين السكان السود.

سجلت منطقة Bronx الإدارية أكبر عدد للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة بين السكان السود.



المواد المرتبطة بحالات الوفاة الناتجة عن تناول جرعة زائدة من العقاقير بين سكان مدينة نيويورك من السود (من الممكن أن ترتبط حالات الوفاة الناتجة عن تناول جرعة زائدة بأكثر من نوع واحد من المواد):



المصدر: اقتصرت بيانات الوفيات الناتجة عن تناول الجرعات الزائدة على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و84 عامًا، وقد حُصل عليها من Office of the Chief Medical Examiner (مكتب كبير الأطباء الشرعيين) في مدينة نيويورك ومكتب إحصاءات الأحوال المدنية التابع لإدارة الصحة والسلامة العقلية في مدينة نيويورك، لعام 2022. وقد تم تحليل البيانات بواسطة Bureau of Alcohol, Drug Use, Prevention, Care and Treatment (مكتب الوقاية وتقديم الرعاية والعلاج لحالات تعاطي الكحول والعقاقير). البيانات لعام 2022 مؤقتة وخاضعة للتغيير.