


الوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة بين سكان منطقة Brooklyn، لعام 2022


من سكان Brooklyn من بين كل 100000 من السكان توفوا بسبب تناول جرعة زائدة من العقاقير. **32.2**

سجل سكان Brooklyn ثاني أقل معدلات الوفاة الناتجة عن تناول جرعة زائدة (من بين كل 100000 من السكان).




من سكان منطقة Brooklyn توفوا بسبب تعاطي جرعة زائدة من المخدرات. **692**


سجل سكان منطقة Brooklyn ثاني أكبر عدد للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.




سجل سكان منطقة Brooklyn ممن تتراوح أعمارهم بين 55 و84 عامًا أعلى معدل للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.




سجل سكان منطقة Brooklyn ممن تتراوح أعمارهم بين 55 و84 عامًا أكبر عدد للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.




سجل سكان منطقة Brooklyn ذوو الأصل اللاتيني أعلى معدل للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.



سجل سكان منطقة Brooklyn من السود أكبر عدد للوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة.



المواد المرتبطة بالوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة من المخدرات (من الممكن أن ترتبط الوفيات الناتجة عن تعاطي جرعة زائدة بأكثر من نوع واحد من المواد):



المصدر: مكتب Office of the Chief Medical Examiner (مكتب كبير الأطباء الشرعيين) في مدينة نيويورك ومكتب إحصاءات الأحوال المدنية التابع لإدارة الصحة والسلامة العقلية في مدينة نيويورك، لعام 2020. تحليل أعدته مكتب Bureau of Alcohol, Drug Use, Prevention, Care and Treatment (مكتب الوقاية وتقديم الرعاية والعلاج لحالات إدمان الكحول والمخدرات). لبيانات لعام 2022 مؤقتة وخاضعة للتغيير.

