

VIRUS ZIKA

DOIS-JE ME FAIRE DÉPISTER ?

La plupart des gens **N'ONT PAS** besoin de passer le test de dépistage du virus Zika, même s'ils ont voyagé dans un pays où le virus se propage.

Certaines femmes enceintes doivent passer le test de dépistage car le virus Zika cause des anomalies congénitales. Un test peut indiquer si une personne a été infectée par le virus Zika, même si elle n'a pas le sentiment d'être malade.

CONTACTEZ UN PRESTATAIRE DE SOINS DE SANTÉ AFIN D'ENVISAGER UN TEST DE DÉPISTAGE DU VIRUS ZIKA SI :

1. pendant votre grossesse, vous vous êtes rendu dans une région contaminée par le virus Zika ;
2. pendant votre grossesse, vous avez eu des relations sexuelles vaginales, anales ou orales non protégées* avec une personne infectée ou susceptible d'être infectée par le virus Zika.

Le test de dépistage du virus Zika implique généralement des prélèvements de sang et d'urine. Si le test indique que vous avez été infectée par le virus Zika, il est possible que d'autres tests soient nécessaires au cours de votre grossesse.

NE VOUS RENDEZ PAS dans une zone contaminée par le virus Zika si vous êtes enceinte ou tentez de concevoir un enfant. Pour plus d'informations sur le virus Zika, les avertissements et alertes de voyage, rendez-vous à l'adresse nyc.gov/health/zika.

Pour une assistance dans la recherche d'un hôpital ou d'une clinique près de chez vous, appelez le 311. Le personnel hospitalier ne vous posera aucune question sur votre statut d'immigrant. Vous serez reçu(e) indépendamment de votre capacité à payer.

NYC
Health

Bill de Blasio,
Maire
Mary Y. Brownell, MD, MPH,
Commissaire

* L'expression « non protégées » désigne des relations sexuelles sans protection, comme les préservatifs masculins, féminins et/ou les digues dentaires.