

ZIKA



TENHO DE FAZER O TESTE?

A maioria das pessoas **NÃO** necessita de realizar testes de diagnóstico do vírus Zika, mesmo que tenha viajado para um país onde exista a propagação do Zika.

Algumas mulheres grávidas devem realizar o teste porque o vírus Zika causa malformações congénitas. Um teste pode revelar se uma pessoa está infetada com o vírus Zika, mesmo que a pessoa não se sinta doente.

CONTACTE O SEU PRESTADOR DE CUIDADOS DE SAÚDE PARA SER AVALIADA E, CASO NECESSÁRIO, REALIZAR TESTES DE DIAGNÓSTICO DO ZIKA SE:

1. Está grávida e viajou para uma área afetada pelo Zika durante a gravidez.
2. Está grávida e tiver tido relações sexuais sem proteção* (vaginais, anais ou orais) durante a gravidez com alguém que esteja ou possa estar infetado com o vírus Zika.

Os testes de diagnóstico do Zika envolvem, normalmente, a recolha de amostras de urina e sangue. **Se o teste revelar que está infetada com o vírus Zika, poderá ter de realizar mais testes durante a gravidez.**

NÃO viaje para uma área afetada pelo Zika se estiver grávida ou a tentar engravidar.
 Encontre informações sobre o vírus Zika, incluindo advertências e alertas relativos a viagens,
 em nyc.gov/health/zika

Se precisar de ajuda para encontrar um hospital ou clínica na sua zona, ligue para o 311. A equipa do hospital não fará perguntas sobre o seu estatuto de imigrante. Será examinada mesmo que não possa pagar a consulta.

NYC
Health

Bill de Blasio
 Presidente da Câmara
 Mary Y. Hannon, MD, MPH
 Comissária

* "Sem proteção" significa ter relações sexuais sem qualquer método de barreira, tal como preservativos masculinos, preservativos femininos e/ou barreiras dentais.