

백신 또는 진료 방문 시 비용이 청구됩니까?

아니요. 여러분이 가진 보험을 대상으로 청구가 이루어질 수 있으나 백신에 대한 본인 부담금이나 기타 비용은 필요하지 않습니다.

개인 정보가 보호됩니까?

여러분의 개인 정보는 엄격하게 보호됩니다. 여러분에 관한 기본 정보(이름, 주소, 전화번호, 생년월일, 백신 접종일 및 접종한 백신 종류 등)는 법에서 요구하는 바에 따라 뉴욕시 보건 및 정신위생부(New York City Department of Health and Mental Hygiene, NYC 보건부)에 공유될 것입니다.

다른 문의 사항이 있는 경우 어떻게 합니까?

백신을 접종한 제공자 또는 담당 의료 서비스 제공자에게 전화로 문의하실 수 있습니다. 또한, **311**번으로도 문의하실 수 있습니다.

더 자세한 정보는 어디에서 얻을 수 있나요?



NYC 보건부:
nyc.gov/covidvaccine

뉴욕주 보건부:
covid19vaccine.health.ny.gov

CDC:
cdc.gov/covidvaccine



NYC 보건부에서는 상황이 진전됨에 따라 권장 사항을 변경할 수 있습니다. **1.12.21**

COVID-19 백신 접종 후 알아야 할 사항



**NYC VACCINE FOR ALL:
SAFE, FREE, EASY**

nyc.gov/covidvaccine

Korean

백신 접종소를 떠나기 전에:

- 이번이 첫 접종인 경우, 3주(Pfizer) 또는 4주(Moderna) 이후에 맞아야 하는 두 번째 접종을 예약하시기 바랍니다.
- 백신 접종 카드를 받으시기 바랍니다. 여러분이 접종한 백신의 종류와 접종 날짜가 표시되어 있습니다. 두 번째 접종 예약일에 이 카드를 지참하고 반드시 첫 접종이 이루어졌던 접종소로 방문하시기 바랍니다. 두 번째 접종 후 백신 카드에 귀하가 접종받은 두 번의 접종 내역이 모두 나와 있는지 확인합니다.

백신의 부작용으로는 무엇이 있습니까?

일반적인 부작용으로는 주사를 맞은 팔의 통증이나 붓기, 두통, 몸살, 피곤함 및 발열이 있습니다. 부작용은 두 번째 접종 이후 더 흔하게 발생하며 고령자에게 덜 나타납니다. 일반적인 부작용은:

- 경증에서 중증입니다
- 백신 접종 후 첫 3일 이내(백신 접종 다음 날이 가장 일반적)에 시작됩니다
- 시작된 후 1~2일 정도 지속됩니다

부작용이 나타나면 어떻게 해야 합니까?

부작용으로 인해 걱정되거나 며칠이 지나도 사라지지 않는 경우, 또는 접종 24시간 후 접종 부위에 붉은 기나 통증이 심해지는 경우 의료 서비스 제공자에게 연락하시기 바랍니다. 아세트아미노펜(Tylenol) 또는 이부프로펜(Advil) 등 비처방 약품 복용에 관하여 담당 서비스 제공자에게 문의합니다.

첫 접종 후 부작용을 겪더라도 담당 서비스 제공자가 금지하는 경우 외에는 두 번째 접종을 받으시기 바랍니다.

질병통제예방센터(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)의 V-safe 스마트폰 앱을 통해 부작용을 보고하시기 바랍니다. 앱에 대한 더 자세한 정보 및 다운로드 는 vsafe.cdc.gov를 방문하시기 바랍니다. 또한, CDC 및 식품의약청(Food and Drug Administration, FDA)에서 관리하는 백신부작용신고시스템(Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS)에서도 보고하실 수 있습니다. 보고는 vaers.hhs.gov/reportevent.html 또는 800-822-7967 번으로 전화하여 제출하실 수 있습니다. 여러분이 보고하는 내용은 기밀로 처리됩니다.

백신에 알러지 반응을 보일 수 있습니까?

현재 알려진 내용을 기반으로 했을 때, 알러지 반응은 드문 편입니다. 알러지 반응은 일반적으로 접종 후 몇 분에서 한 시간 이내에 시작됩니다. 심각한 알러지 반응의 징후로는 호흡 곤란, 얼굴과 목의 부어오름, 빠른 심박수, 전신의 발진, 어지러움과 쇠약 등이 있습니다. 중증 알레르기 반응을 경험하면 **911번**으로 전화하거나 가까운 병원을 방문하시기 바랍니다.

두 번째 접종은 첫 번째 접종과 같은 종류여야 합니까?

네. 두 번의 접종은 모두 동일한 백신이어야 합니다. Pfizer 백신을 접종하는 경우, 21일 후 두 번째 Pfizer 백신을 접종해야 합니다.

Moderna 백신을 접종하는 경우, 28일 후 두 번째 Moderna 백신을 접종해야 합니다.

백신은 언제부터 효과를 발휘합니까?

첫 접종 이후에는 일부 보호 조치를 취해야 하는 반면, 두 번째 접종 후에는 그 효과가 훨씬 커집니다. 두 번째 접종 후 1~2주가 지날 때까지는 백신의 완전한 보호 효과가 나타나지 않습니다.

백신 접종 후에는 다른 COVID-19 예방 조치를 중단해도 됩니까?

아니요. 백신 이후에도 계속 예방 조치를 취해야 합니다.

- 몸이 좋지 않은 경우 자택에 머무르십시오.
- 타인으로부터 최소 6피트 거리를 유지하십시오.
- 얼굴 커버를 착용합니다.
- 자주 손을 씻고 손 세정제를 사용합니다.

COVID-19 백신이 사람들을 COVID-19로부터 보호함에도 불구하고, 보호 효과의 지속 기간 및 백신의 전파 방지 효과를 더 자세히 조사할 필요가 있습니다.

