

Atualização sobre a vacina contra a COVID-19 da Johnson & Johnson/Janssen

Após uma pequena pausa na aplicação para investigação de um possível problema sanitário, a vacina contra a COVID-19 da Johnson & Johnson/Janssen COVID-19 está disponível em NYC para pessoas com 18 anos ou mais. O Departamento de Saúde e Higiene Mental de NYC (Departamento de Saúde de NYC) mantém sua confiança na segurança e eficácia da vacina da Johnson & Johnson e em outras vacinas autorizadas contra a COVID-19. A vacinação continua sendo a ação mais importante para a sua proteção, para a proteção de seus entes queridos e de suas comunidades contra a COVID-19.

Por que houve uma pausa da administração da vacina da Johnson & Johnson?

Em 13 de abril de 2021, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) e a Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) recomendaram a interrupção temporária do uso da vacina da Johnson & Johnson após relatórios indicarem um coágulo sanguíneo raro em seis pessoas que receberam a vacina. Os casos foram identificados pelo sistema de monitoramento de segurança da vacina do CDC e da FDA. O uso da vacina foi pausado para a coleta e análise de informações adicionais.

O que a investigação mostrou?

Desde 21 de abril de 2021, houve 15 casos de um tipo raro de coágulo sanguíneo com baixa quantidade de plaquetas sanguíneas dentre aproximadamente 8 milhões de pessoas que receberam a vacina da Johnson & Johnson desde que ela foi autorizada. Essa condição é chamada de síndrome de trombose (coágulo sanguíneo) com trombocitopenia (baixa contagem de plaquetas) (thrombosis with thrombocytopenia syndrome, TTS). Todos os casos reportados de TTS ocorreram em mulheres de 18 a 59 anos, e os sintomas começaram de seis a 15 dias após a vacinação. É uma taxa de cerca de sete casos de TTS por um milhão de mulheres com 18 a 49 anos que receberam a vacina, e menos de um caso por um milhão de mulheres com 50 anos ou mais que receberam a vacina. Também houve um caso de TTS em um participante do sexo masculino nos estudos clínicos da vacina.

O que o CDC e a FDA recomendam com relação ao uso da vacina?

O CDC e a FDA recomendam que a vacina da Johnson & Johnson continue sendo administrada a pessoas com 18 anos ou mais. Essa decisão se baseou em uma recomendação do Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização, um grupo independente de especialistas em medicina e saúde pública, que analisou os dados e as informações disponíveis e ponderaram os possíveis riscos à saúde da vacina em comparação com os benefícios. As pessoas que receberam a vacina, principalmente mulheres com menos de 50 anos, devem estar cientes do risco, raro, mas cada vez maior, de TTS e de que há outras opções de vacina contra a COVID-19 disponíveis nas quais o risco não apareceu.

Por que NYC ainda está usando a vacina mesmo com esse problema de segurança?

O risco de TTS é muito baixo, e a vacina é muito eficiente na prevenção de doenças graves, hospitalização e morte em decorrência da COVID-19. Agora que conhecemos o risco, podemos dar às pessoas que receberam a vacina da Johnson & Johnson as informações necessárias para a identificação dos possíveis sintomas de TTS e recebimento do atendimento imediato. Os profissionais da saúde já estão cientes desse risco, ou seja, podem diagnosticar e tratar pacientes que desenvolveram TTS após receberam a vacina da Johnson & Johnson. Nenhum remédio, terapia ou vacina está livre de riscos.

Se eu optar por receber a vacina da Johnson & Johnson, precisarei tomar cuidados extras?

Apesar de o risco de TTS após a administração da vacina da Johnson & Johnson ser muito baixo, preste atenção aos possíveis sintomas durante três semanas após o recebimento da vacina, tais como:

- Falta de ar
- Dor no peito
- Inchaço na perna
- Dor abdominal duradoura
- Dor de cabeça grave ou duradoura
- Visão embaçada
- Facilidade em sofrer equimose
- Pequenos pontos vermelhos abaixo da pele para além da área do local da injeção

Se você apresentar qualquer um desses sintomas em até três semanas após a vacinação, busque atendimento médico imediato em um hospital próximo ou ligue para **911**. Informe ao provedor do tratamento que você recebeu a vacina da Johnson & Johnson.

Em comparação, os efeitos colaterais comuns após a vacinação incluem sensibilidade ou inchaço no braço no qual você recebeu a dose, cansaço, dores leves, calafrios, dor de cabeça branda ou febre baixa. Esses são os efeitos colaterais esperados e normalmente começam nos primeiros três dias após a vacinação (sendo mais comuns no dia seguinte à vacinação). Normalmente, duram de um a dois dias.

Há risco de TTS com as outras vacinas contra a COVID-19?

Não houve associação de TTS com as vacinas contra a COVID-19 da Pfizer-BioNTech e da Moderna após mais de 200 milhões de doses administradas nos EUA. Incentivamos as pessoas que não desejam receber a vacina da Johnson & Johnson a considerar uma dessas outras vacinas.

Há centenas de locais de vacinação disponíveis em NYC. Acesse vaccinefinder.nyc.gov para encontrar um local de vacinação (as vacinas oferecidas em cada local estão indicadas) ou ligue para 877-829-4692 para obter ajuda para marcar um horário em um local administrado pela cidade. Muitos locais já contam com vacinação de livre acesso. Clique [aqui](#) para obter uma lista dos locais de livre acesso administrados pela cidade.

Como podemos saber se não há outros problemas de segurança com as vacinas?

As vacinas contra a COVID-19 continuam passando por monitoramento intenso de segurança pelo CDC, FDA e outros órgãos. A identificação de um pequeno número de casos de TTS dentre

as milhões de doses de vacina administradas nos EUA, e a pausa no uso da vacina da Johnson & Johnson, mostram que os sistemas de segurança funcionam e que a transparência e a segurança são prioridades. Estamos comprometidos com o compartilhamento de informações sobre as vacinas, incluindo quaisquer possíveis problemas de segurança.

Onde posso encontrar mais informações?

Se você tiver dúvidas, ligue para o seu médico ou para **311**. Para obter informações e recursos sobre a vacina contra a COVID-19, acesse nyc.gov/covidvaccine. Encontre a folha de dados sobre a vacina da Johnson & Johnson revisada pela FDA [aqui](#). Encontre informações adicionais no site do CDC clicando [aqui](#).

O Departamento de Saúde de NYC pode mudar as recomendações de acordo com a evolução da situação. 4.29.21