

Johnson & Johnson کی COVID-19 ویکسین کے متعلق تازہ ترین معلومات

Johnson & Johnson کی COVID-19 ویکسین، اس ویکسین سے متعلق صحت کے ایک ممکنہ مسئلے کی تحقیقات کرنے کے لیے مختصر عرصے کے لیے استعمال میں وقفے کے بعد NYC میں 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے دستیاب ہے۔ NYC محکمہ صحت و ذہنی حفظان صحت (NYC محکمہ صحت) کا Johnson & Johnson کی ویکسین اور دیگر منظور شدہ COVID-19 ویکسینوں کے محفوظ اور مؤثر ہونے پر اعتماد برقرار ہے۔ ویکسینیشن ہی وہ سب سے اہم قدم ہے جو آپ خود کو، اپنے پیاروں کو اور ہماری کمیونٹیوں کو COVID-19 سے محفوظ رکھنے کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔

Johnson & Johnson ویکسین کے استعمال میں وقفہ کیوں آیا تھا؟

13 اپریل 2021 کو مراکز برائے بیماری پر کنٹرول اور روک تھام (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) اور فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (Food and Drug Administration, FDA) نے ویکسین لگوانے والے چھ افراد میں خون کے ایک بہت کم پائے جانے والے لوتھرے کی اطلاعات کے بعد تجویز کیا کہ Johnson & Johnson ویکسین کے استعمال کو عارضی طور پر روک دیا جائے۔ ان کیسوں کی شناخت CDC اور FDA کے ویکسین کے باحفاظت ہونے کی نگرانی کرنے کے نظام نے کی۔ ویکسین کا استعمال مزید معلومات اکٹھی کر کے ان کا تجزیہ کرنے کے لیے روکا گیا۔

تحقیقات سے کیا سامنے آیا؟

21 اپریل 2021 تک، Johnson & Johnson ویکسین کی منظوری کے بعد سے یہ ویکسین لگوانے والے تقریباً 80 لاکھ افراد میں سے خون کے پلیٹلٹ کی کم مقدار کے حامل ایک بہت کم پائے جانے والے خون کے لوتھرے والے 15 کیسز تھے۔ اس کیفیت کو تھرومبوسس (خون کا لوتھرے) مع تھرومبوسائٹوپینیا (خون میں پلیٹلٹ کی کم مقدار) سنڈروم (thrombosis with thrombocytopenia syndrome, TTS) کہا جاتا ہے۔ TTS کے تمام رپورٹ شدہ کیسز 18 سے 59 سال کی خواتین میں تھے، اور علامات ویکسین لگوانے کے چھ سے 15 دن بعد شروع ہوئی تھیں۔ یہ شرح 18 سے 49 سال کی عمر کی خواتین جن کو ویکسین لگی ان میں TTS کے تقریباً سات کیس فی دس لاکھ ہے اور 50 سال اور اس سے زائد عمر کی خواتین جن کو ویکسین لگی ان میں ایک سے کم کیس فی دس لاکھ ہے۔ ویکسین کے کلینیکل ٹرائلز کے دوران TTS کا ایک کیس ایک شرکت کنندہ مرد میں بھی تھا۔

CDC اور FDA اس ویکسین کے استعمال کے متعلق کیا تجویز دیتے ہیں؟

CDC اور FDA تجویز دیتے ہیں کہ Johnson & Johnson کی ویکسین 18 سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کو لگائی جانی جاری رکھی جائے۔ یہ فیصلہ ایڈوائزری کمیٹی برائے امیونائزیشن پریکٹسز کی تجویز کی بنیاد پر ہے، جو کہ طبی اور صحت عامہ کے ماہرین کا ایک غیر جانبدار گروپ ہے جنہوں نے دستیاب ڈیٹا اور معلومات کا جائزہ لیا اور ویکسین لگوانے کے صحت کو ممکنہ خطرات کے مقابلے میں اس کے فوائد کو پرکھا۔ ویکسین لگوانے والے افراد خاص طور پر 50 سال سے کم عمر کی خواتین کو TTS کے کم بہت کم واقع ہونے والے لیکن بڑھے ہوئے خطرے کے متعلق آگاہ ہونا چاہیے اور اس بات سے کہ COVID-19 ویکسین کے دیگر آپشن موجود ہیں جن میں یہ خطرہ نہیں دیکھا گیا۔

اس حفاظتی مسئلے کے باوجود NYC اس ویکسین کو پھر بھی کیوں استعمال کر رہا ہے؟

TTS کا خطرہ بہت کم ہے اور یہ ویکسین COVID-19 کے باعث ہونے والی شدید بیماری، ہسپتال داخل کیے جانے اور موت سے بچانے میں بہت مؤثر ہے۔ اب جبکہ ہم اس خطرے کے متعلق جان گئے ہیں، ہم Johnson & Johnson ویکسین لگوانے والے افراد کو وہ معلومات فراہم کر سکتے ہیں جن کی ان کو TTS کی علامات کو پہچاننے اور فوری طور پر طبی امداد حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ اب نگہداشت صحت فراہم کنندگان بھی اس خطرے سے آگاہ ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ ان لوگوں کی تشخیص اور علاج کر سکتے ہیں جن کو Johnson & Johnson ویکسین لگوانے کے بعد TTS ہو جائے۔ کوئی دوا، علاج یا ویکسین 100% خطرے سے خالی نہیں ہے۔

اگر میں **Johnson & Johnson** ویکسین لگوانے کا فیصلہ کروں تو کیا مجھے کوئی اضافی احتیاط کرنا ہو گی؟
اگرچہ آپ کو **Johnson & Johnson** سے TTS ہونے کا خطرہ بہت کم ہے، آپ کو ویکسین لگوانے کے بعد تین ہفتے تک ممکنہ علامات کے لیے اپنی نگرانی کرنا ہو گی، جیسے کہ:

- دم گھٹنا
- سینے میں درد
- ٹانگ میں سوجن
- ہر وقت پیٹ میں درد رہنا
- سر میں بہت تیز یا ہر وقت درد رہنا
- نظر دھندلانا
- فوراً نیل پڑ جانا
- انجکشن لگنے کے مقام سے ہٹ کر جلد کے نیچے ننھے ننھے سرخ دھبے

اگر ویکسین لگوانے کے تین ہفتے کے اندر آپ میں ان میں سے کوئی علامات ظاہر ہوں تو فوراً طبی امداد حاصل کریں — قریبی ہسپتال چلے جائیں یا **911** پر کال کریں۔ علاج فراہم کنندہ کو بتائیں کہ آپ کو **Johnson & Johnson** ویکسین لگی تھی۔

اس کے برعکس، ویکسین لگوانے کے بعد جو علامات عام ہیں ان میں آپ کے جس بازو پر ٹیکا لگا تھا اس میں سوزش یا سوجن، تھکاوٹ، ہلکے درد، ٹھنڈ محسوس ہونا، ہلکا سر درد یا ہلکے درجے کا بخار شامل ہیں۔ یہ متوقع ضمنی اثرات ہیں اور عام طور پر ویکسین لگوانے کے بعد تین دن کے اندر شروع ہوتے ہیں (ویکسین لگوانے کے اگلے دن سب سے زیادہ عام ہیں) اور شروع ہونے کے بعد عام طور پر تقریباً ایک سے دو دن تک جاری رہتے ہیں۔

کیا دوسری COVID-19 ویکسینوں سے TTS کا خطرہ ہے؟

امریکہ میں ویکسین کے 200 ملین سے زائد ٹیکے لگانے جا چکے کے بعد بھی TTS کو **Pfizer-BioNTech** اور **Moderna** کی COVID-19 ویکسینوں کے ساتھ منسوب نہیں کیا گیا ہے۔ جو لوگ **Johnson & Johnson** ویکسین نہیں لگوانا چاہتے ہم ان کو پر زور تجویز دیتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک ویکسین لگوانے پر غور کریں۔

NYC بھر میں سینکڑوں ویکسینیشن سائٹس دستیاب ہیں۔ ویکسینیشن سائٹ تلاش کرنے کے لیے vaccinefinder.nyc.gov ملاحظہ کریں (ہر سائٹ پر پیش کی جانے والی ویکسینوں کے نام دیے گئے ہیں) یا سٹی کے زیر انتظام چلائی جانے والی کسی سائٹ پر اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے متعلق معاونت کے لیے **877-829-4692** پر کال کریں۔ کئی سائٹس براہ راست آ جانے والوں کو قبول کر رہی ہیں۔ سٹی کے زیر انتظام چلائی جانے والی سائٹس کی فہرست کے لیے [یہاں](#) ملاحظہ کریں۔

ہمیں یہ کیسے معلوم ہو گا کہ ویکسین کے محفوظ ہونے سے متعلق کوئی اور مسائل نہیں ہیں؟
COVID-19 کی ویکسینیں مسلسل **CDC**، **FDA** اور دیگر گروپس کی جانب سے محفوظ ہونے کے متعلق کڑی نگرانی سے گزر رہی ہیں۔ پورے امریکہ میں لگائے گئے ویکسین کے دسیوں لاکھ ٹیکوں میں سے ایک چھوٹی سی تعداد میں TTS کی شناخت ہونا اور **Johnson & Johnson** ویکسین کے استعمال میں وقفہ لایا جانا ظاہر کرتا ہے کہ حفاظتی نظام کام کر رہے ہیں اور حفاظت اور شفافیت اولین ترجیح ہیں۔ ہم کسی ممکنہ حفاظتی مسائل سمیت ویکسینوں کے متعلق معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے ہر عزم ہیں۔

مزید معلومات کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہیں؟

اگر آپ کے ذہن میں مزید سوالات ہیں تو براہ مہربانی اپنے نگہداشت فراہم کنندہ کو یا **311** پر کال کریں۔ COVID-19 کی ویکسین کے متعلق معلومات اور دیگر وسائل کے لیے nyc.gov/covidvaccine ملاحظہ کریں۔ **Johnson & Johnson** کے متعلق **FDA** کا ترمیم شدہ حقائق نامہ [یہاں](#) پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اضافی معلومات **CDC** کی ویب سائٹ پر [یہاں](#) دستیاب ہیں۔

4.29.21

صورت حال کے ارتقاء کو دیکھتے ہوئے **NYC** محکمہ صحت سفارشات تبدیل کر سکتا ہے۔