

Doses supplémentaires et doses de rappel de vaccin contre la COVID-19

	Dose supplémentaire pour les personnes immunodéprimées	Doses de rappel
De quoi s'agit-il ?	Une dose supplémentaire destinée aux personnes qui n'ont pas eu une réponse immunitaire suffisamment forte après leurs doses précédentes	Une dose supplémentaire d'un vaccin offrant une protection supplémentaire
Qui est éligible ?	Les personnes âgées de 5 ans et plus, légèrement ou sévèrement immunodéprimées	Les personnes âgées de 12 ans et plus
Pourquoi recevoir l'injection ?	Certaines personnes immunodéprimées ne réagissent pas aussi bien aux vaccins. Une troisième dose peut renforcer leur réponse immunitaire.	Bien que les vaccins protègent très efficacement contre les maladies graves, la protection contre les maladies bénignes ou modérées peut ne pas être aussi efficace, ou peut diminuer avec le temps.
Quelle marque de vaccin ?	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez reçu le vaccin Pfizer ou Moderna, prenez la même marque que vos deux premières doses si possible. • Si vous avez reçu le vaccin Johnson & Johnson ou un autre vaccin, prenez le vaccin Pfizer ou Moderna. 	Soit le même vaccin que votre premier vaccin, soit un autre vaccin. Les vaccins Pfizer et Moderna sont à privilégier.
Quand puis-je la recevoir ?	Au moins 28 jours après votre deuxième dose de vaccin Pfizer ou Moderna, ou votre dose unique de vaccin Johnson & Johnson.	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez reçu le vaccin Pfizer ou Moderna, au moins cinq mois après votre deuxième dose (ou au moins trois mois après votre dose supplémentaire si vous êtes légèrement ou sévèrement immunodéprimé(e)). • Si vous avez reçu le vaccin Johnson & Johnson, au moins deux mois après la vaccination.
De quels documents dois-je me munir ?	Preuve d'âge. Vous devrez également confirmer que vous souffrez d'un problème de santé admissible. Apportez votre carte de vaccination si vous en avez une.	Preuve d'âge. Apportez votre carte de vaccination si vous en avez une.
Y a-t-il des effets secondaires ?	Vous pouvez ressentir des effets secondaires, tels que des douleurs dans le bras, des maux de tête, des courbatures, de la fatigue et de la fièvre.	Vous pouvez ressentir des effets secondaires, tels que des douleurs dans le bras, des maux de tête, des courbatures, de la fatigue et de la fièvre.
Est-ce gratuit ?	Oui.	Oui.
Où puis-je avoir de plus amples informations ?	Consultez on.nyc.gov/additionaldose .	Consultez on.nyc.gov/vaccinefacts .

Pour trouver un site de vaccination, rendez-vous sur nyc.gov/vaccinefinder ou appelez le 877 829 4692. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site nyc.gov/covidvaccine.

Le Département de la santé de NYC peut modifier ses recommandations en fonction de l'évolution de la situation. 3.15.22