

Vaccins contre le COVID-19 : troisième dose pour les personnes immunodéprimées

Il est recommandé que certaines personnes modérément ou gravement immunodéprimées (c'est-à-dire dont le système immunitaire est affaibli) reçoivent trois doses du vaccin contre le COVID-19 de Pfizer ou Moderna, plutôt que le schéma standard à deux doses. Des doses supplémentaires de vaccin ne sont recommandées pour aucun autre groupe à l'heure actuelle.

Qui peut recevoir une troisième dose ?

Les personnes âgées de 12 ans ou plus, atteintes d'un problème de santé ou prenant des médicaments ou des traitements qui affaiblissent modérément ou gravement leur système immunitaire, et qui reçoivent le vaccin Pfizer ou Moderna peuvent recevoir une troisième dose.

Les problèmes de santé et les traitements peuvent inclure :

- traitement en cours contre le cancer ;
- vous avez reçu une greffe d'organe et vous suivez un traitement immunosuppresseur ;
- vous avez reçu une greffe de cellules souches au cours des deux dernières années ;
- immunodéficiences primaires modérées ou graves ;
- VIH avancé ou non traité ;
- traitement actif avec une forte dose de corticostéroïdes ou d'autres médicaments qui affaiblissent modérément ou gravement votre système immunitaire.

Ce n'est pas une liste complète. La recommandation d'une troisième dose concerne les personnes qui présentent des affections telles que celles énumérées ci-dessus et non la plupart des personnes présentant d'autres affections telles que le diabète ou une maladie cardiaque ou pulmonaire. Si vous souffrez d'immunodépression ou si vous prenez des médicaments qui affaiblissent votre système immunitaire, discutez avec votre médecin pour savoir si vous devez recevoir une troisième dose.

Pourquoi une troisième dose est-elle recommandée ?

Cette recommandation se fonde sur des études qui montrent que les vaccins ne fonctionnent pas aussi bien chez certaines personnes immunodéprimées que chez les autres.

Comment puis-je savoir si j'ai besoin d'une troisième dose ?

Vous devriez discuter avec votre médecin de la possibilité de recevoir une troisième dose. Votre médecin tiendra compte de vos problèmes de santé, du traitement que vous recevez, du risque d'infection et d'autres facteurs. Pour l'instant, les tests d'anticorps ne sont pas recommandés pour déterminer si vous avez une immunité (protection) contre le COVID-19.

La prise d'une troisième dose est-elle sans danger ?

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration, FDA), les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) et des experts indépendants ont déterminé que les avantages d'une troisième dose l'emportent sur les risques connus ou potentiels.

Qu'en est-il des personnes qui ont reçu le vaccin Johnson & Johnson/Janssen ?

Pour l'instant, les personnes immunodéprimées qui ont reçu le vaccin contre le COVID-19 de Johnson & Johnson ne peuvent pas recevoir une autre dose. Nous espérons que des informations supplémentaires seront bientôt disponibles.

Quand dois-je recevoir ma troisième dose ?

Vous devez recevoir votre troisième dose au moins quatre semaines après votre deuxième dose. Vous pouvez recevoir une troisième dose, quel que soit le temps écoulé depuis votre deuxième dose.

La troisième dose doit-elle être de la même marque de vaccin que les deux premières doses ?

Votre troisième dose doit être de la même marque de vaccin que vos deux premières doses, si possible. Si vous ne pouvez pas obtenir la même marque de vaccin (Pfizer ou Moderna), vous pouvez obtenir l'autre marque (Pfizer ou Moderna).

Où puis-je obtenir une troisième dose ?

Vous pouvez obtenir une troisième dose aux mêmes endroits que les autres doses de vaccin, comme les centres de vaccination gérés par la ville, les pharmacies, les hôpitaux, les centres de santé communautaires et les cabinets médicaux. Vous n'êtes pas obligé(e) de recevoir votre troisième dose au même endroit où vous avez reçu vos deux premières doses. Pour trouver un centre de vaccination, rendez-vous sur le site nyc.gov/vaccinefinder ou appelez le 877 829 4692. Recherchez un centre qui propose la même marque de vaccin que vos deux premières doses (Pfizer ou Moderna). Vous pouvez également programmer une vaccination gratuite à domicile en vous rendant sur le site nyc.gov/homevaccine ou en appelant le numéro ci-dessus.

Une troisième dose est-elle gratuite ?

Oui, la troisième dose est gratuite pour les personnes éligibles. Si vous êtes assuré(e), elle sera peut-être facturée à la compagnie d'assurance, mais ni un co-paiement ni aucun autre montant ne vous seront demandés.

De quels documents ai-je besoin pour obtenir une troisième dose ?

Il vous sera demandé d'attester que vous souffrez d'un problème de santé admissible. Aucun autre document ne sera exigé.

Les personnes immunodéprimées peuvent-elles arrêter de prendre d'autres précautions après avoir reçu une troisième dose ?

Non. Les personnes immunodéprimées courent un risque accru de contracter une maladie grave liée au COVID-19 et le vaccin peut être plus efficace chez certaines personnes immunodéprimées que chez d'autres. C'est pourquoi, quel que soit votre statut vaccinal, vous devez continuer à prendre toutes les précautions nécessaires, notamment éviter les foules (surtout à l'intérieur), porter un masque et pratiquer la distanciation physique chaque fois que vous êtes en dehors de votre domicile. En outre, il est particulièrement important que les personnes qui vivent ou sont régulièrement en contact avec une personne immunodéprimée se fassent vacciner.

Que doivent faire les personnes immunodéprimées si elles présentent des symptômes du COVID-19 ou si elles sont exposées à une personne atteinte du COVID-19 ?

Indépendamment du statut vaccinal, les personnes immunodéprimées qui présentent des symptômes du COVID-19 ou qui sont exposées à une personne atteinte du COVID-19 doivent se faire dépister et contacter immédiatement leur prestataire de soins de santé pour discuter du traitement par anticorps monoclonaux et des options de prévention. Les anticorps monoclonaux sont d'autant plus efficaces qu'ils sont administrés rapidement. Cependant, ce traitement ne remplace pas la vaccination. Pour plus d'informations, consultez « [Traitement par anticorps monoclonaux contre la COVID-19](#) ».

Le département de la Santé de NYC peut modifier ses recommandations en fonction de l'évolution de la situation.

8.13.21