

## COVID-19 백신: 면역력이 저하한 사람을 위한 3차 접종

면역력이 중증도에서 중증인 사람(면역력이 저하한 사람이란 의미) 중 일부는 화이자나 모더나 COVID-19 백신의 표준 접종 방식인 2회 보다는 3회를 접종할 것을 권장합니다. 현재 그 외 사람에게는 추가적인 백신 접종을 권장하지 않습니다.

### 누가 3차 접종 대상입니까?

기저 질환이 있거나 면역 체계가 중증도에서 중증 수준으로 약화하여 약물을 복용하거나 치료를 받고 있으며 화이자 또는 모더나 백신을 접종한 만 12세 이상의 사람이 3차 접종 대상자입니다.

질환과 치료에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 적극적인 암 치료
- 장기 이식을 받은 후 면역 억제 요법 중
- 지난 2년 이내에 줄기 세포 이식을 받음
- 중증도에서 중증 일차 면역결핍증
- 심각하거나 미치료 상태의 에이즈
- 면역 체계를 중증도에서 중증 수준으로 약화하는 코르티코스테로이드나 기타 약물을 다량 사용하는 적극 치료

이 목록의 내용이 전부는 아닙니다. 3차 접종은 상기 나열된 질환이 있거나 치료를 받는 사람에게 권장되지 당뇨병이나 심장 또는 폐 질환 등 기타 질환이 있는 사람에게는 대부분 권장되지 않습니다. 귀하에게 면역력을 저하하는 질환이 있거나 귀하가 면역 체계를 약화하는 약물을 복용 중이라면 3차 접종 여부는 주치의와 상의하시기 바랍니다.

### 3차 접종을 권장하는 이유는 무엇입니까?

여러 연구를 토대로 볼 때 면역력 저하 질환이 있는 사람에게는 그렇지 않은 사람과 비교 시 백신의 효능이 덜하다는 것이 입증되었으므로 그렇게 권장하고 있습니다.

### 제게 3차 접종이 필요한지 어떻게 압니까?

3차 접종 여부는 귀하의 주치의와 상담해야 합니다. 주치의가 귀하의 질환, 받고 있는 치료, 감염 위험, 기타 인자들을 고려할 것입니다. 현재 항체 검사는 COVID-19에 면역력(보호력)이 있는지 여부를 판단하는 데 권장되지 않습니다.

### 3차 접종은 안전합니까?

식품의약국(Food and Drug Administration, FDA), 미국 질병통제예방센터(Centers for Disease Control and Prevention, CDC), 독립 전문가들이 3차 접종의 혜택이 알려져 있거나 잠재적 위험을 능가한다고 판단했습니다.

### 존슨앤존슨 안센 백신을 접종한 사람은 어떻게 됩니까?

현재 면역력이 저하한 상태이고 존슨앤존슨 COVID-19 백신을 접종한 사람은 추가 접종 대상자가 아닙니다. 추가 정보가 곧 나올 것으로 예상합니다.

### 3차는 언제 접종해야 하나요?

3차는 2차 접종 후 최소 4주가 지난 후에 접종해야 합니다. 2차 접종 후 시간이 얼마나 지났든 상관없이 3차를 접종해도 됩니다.

### 3차 접종은 첫 2회 접종한 백신 브랜드와 같아야 하나요?

3차 접종은 가능하면 첫 2회와 같은 백신 브랜드로 해야 합니다. 동일한 브랜드(화이자나 모더나)로 접종할 수 없다면 다른 브랜드(화이자나 모더나)를 접종해도 됩니다.

### 3차 접종은 어디에서 할 수 있습니까?

3차 접종은 시 운영 백신 접종소, 약국, 병원, 지역 사회 건강 센터, 개인 병원 등 동일한 장소에서 해도 됩니다. 첫 2회를 접종한 곳에서 3차를 접종할 필요는 없습니다. 백신 접종소는 [nyc.gov/vaccinefinder](https://nyc.gov/vaccinefinder) 또는 877-829-4692번에서 찾아보시기 바랍니다. 첫 2회 접종 시 사용한 브랜드와 같은 백신 브랜드를 제공하는 접종소를 찾아보십시오(화이자나 모더나). 또한, [nyc.gov/homevaccine](https://nyc.gov/homevaccine)에서 또는 위의 번호로 전화하여 무료 자택 백신을 예약하실 수 있습니다.

### 3차 접종은 무료입니까?

네, 3차 접종은 대상자에게 무료로 제공됩니다. 보험이 있는 경우 청구가 이루어질 수 있으나 본인 부담금이나 기타 비용은 필요하지 않습니다.

### 3차 접종에는 어떤 문서가 필요하나요?

해당하는 질환이 있다고 입증할 것을 요구받을 것입니다. 다른 증빙 문서는 요구되지 않습니다.

### 면역력이 저하한 사람은 3차를 접종한 후 기타 예방 조치를 중단해도 되나요?

아닙니다. 면역력이 저하한 사람은 중증 COVID-19 질환을 앓을 위험이 크며, 백신이 면역력이 저하한 사람에게 모두 똑같이 효능을 나타내지 않을 수 있습니다. 그러니 백신 접종 상태에 상관없이 사람이 밀집한 곳을 피하고(특히 실내), 마스크를 착용하고, 외출 시에는 물리적 거리 두기를 실천하는 등 모든 예방 조치를 지속해야 합니다. 또한 면역력이 저하한 사람과 함께 살거나 정기적으로 접촉하는 사람은 백신 접종이 특히 중요합니다.

### 면역력이 저하한 사람이 COVID-19 증상을 보이거나 COVID-19 감염자에게 노출되면 무엇을 해야 하나요?

백신 접종 상태에 상관없이 면역력이 저하한 사람 중 COVID-19 증상이 보이거나 COVID-19 감염자에게 노출되면 당장 검사를 받고 의료 서비스 제공자에게 연락하여 단클론 항체 치료와 예방 선택지에 관해 논의해야 합니다. 단클론 항체 치료는 빠를수록 효과가 더 좋습니다. 하지만 이 치료가 백신 접종을 대신하지는 않습니다. 더 자세한 정보는 [COVID-19 단클론 항체 치료](#)를 확인하시기 바랍니다.

NYC 보건부에서는 상황이 진전됨에 따라 권장 사항을 변경할 수 있습니다.

8.13.21