

## COVID-19 疫苗第三劑與加強劑比較

	第三劑	加強劑
它是什麼？	給未對前兩劑 COVID-19 疫苗產生足夠強烈反應的人士額外接種的一劑疫苗	給接種 COVID-19 疫苗後已建立保護能力、但保護能效或已隨時間推移而下降的人士額外接種的一劑疫苗
誰有資格接種？	年齡 <b>12 歲</b> 及以上、接種了輝瑞 (Pfizer) 或莫德納 (Moderna) 疫苗且存在中度至重度免疫功能低下的人士	年齡 <b>18 歲</b> 及以上、接種了輝瑞 (Pfizer) 疫苗且存在出現下述任何一種情況之高風險的人士： <ul style="list-style-type: none"> <li>因年齡（65 歲或以上）或基礎病而導致 COVID-19 重症</li> <li>因居住或工作地點原因而接觸 COVID-19</li> </ul>
為何接種？	研究顯示，部分免疫功能低下者對疫苗的反應不如免疫功能正常者。第三劑可能改善免疫反應。	部分研究顯示，雖然疫苗防止重症效果很好，但預防感染的保護效力在約 6 個月後可能開始下降。加強劑可提供額外保護。
接種哪款？	<ul style="list-style-type: none"> <li>如果前兩劑是輝瑞，第三劑仍應為輝瑞</li> <li>如果前兩劑是莫德納，第三劑仍應為莫德納</li> </ul>	如果前兩劑是輝瑞，加強劑仍應為輝瑞
我何時有資格接種？	第二劑接種後至少 28 天	第二劑接種後至少 6 個月
需要哪些證明文件？	<ul style="list-style-type: none"> <li>年齡證明</li> <li>證明您有符合接種條件的健康狀況</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>年齡證明</li> <li>未滿 65 歲者需證明有符合接種條件的健康狀況或更高的接觸 COVID-19 風險</li> </ul>
是否有副作用？	與前兩劑一樣，您可能出現手臂酸痛、頭痛、身體疼痛、疲倦和發燒等副作用反應。	與前兩劑一樣，您可能出現手臂酸痛、頭痛、身體疼痛、疲倦和發燒等副作用反應。
能否與其他疫苗同時接種？	是的，您可以在接種其他疫苗的同時（或者之前或之後的任何時間）接種 COVID-19 疫苗。	是的，您可以在接種其他疫苗的同時（或者之前或之後的任何時間）接種 COVID-19 疫苗。
是否免費？	是的	是的
何處瞭解更詳細資訊？	請造訪 <a href="https://nyc.gov/covidvaccine">nyc.gov/covidvaccine</a> 查找 <a href="#">Third Dose for People Who are Immunocompromised</a> （免疫功能低下者接種的第三劑）。如有任何疑問，請諮詢您的健康照護提供者。	請造訪 <a href="https://nyc.gov/covidvaccine">nyc.gov/covidvaccine</a> 查找 <a href="#">Recommendation for Pfizer COVID-19 Booster Shots</a> （關於接種輝瑞 COVID-19 疫苗加強劑的建議）。如有任何疑問，請諮詢您的健康照護提供者。

如需查找疫苗接種站點，請造訪 [nyc.gov/vaccinefinder](https://nyc.gov/vaccinefinder) 或致電 877-829-4692。