

Comparazione tra terza dose e richiamo del vaccino anti COVID-19

	Terza dose	Richiamo vaccinale
Che cos'è?	Una dose addizionale di vaccino per le persone che non hanno avuto una risposta immunitaria abbastanza forte alle prime due dosi di vaccino anti COVID-19.	Una dose addizionale di vaccino per le persone che, a seguito della vaccinazione anti COVID-19, hanno sviluppato una protezione biologica che, però, è andata diminuendo nel tempo.
Chi è idoneo?	Coloro che hanno compiuto almeno 12 anni , che hanno ricevuto i vaccini Pfizer o Moderna e che hanno un'immunodeficienza da moderata a grave.	Coloro che hanno compiuto almeno 18 anni , che hanno ricevuto il vaccino Pfizer e hanno un rischio più elevato di sviluppare una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> malattia grave da COVID-19 a causa della loro età (65 anni o oltre) o di condizioni mediche pregresse; esposizione al COVID-19 per motivi lavorativi o abitativi.
Perché farlo?	Studi scientifici dimostrano che alcune persone immunocompromesse non rispondono altrettanto bene ai vaccini tanto quanto coloro che non hanno un sistema immunitario compromesso. Una terza dose potrebbe migliorare la risposta immunitaria.	Alcuni studi dimostrano che, sebbene il vaccino funzioni molto bene contro la malattia grave, tuttavia la protezione biologica da esso fornita potrebbe cominciare a diminuire dopo circa sei mesi. Un richiamo vaccinale potrebbe aumentare tale protezione.
Quale vaccino?	<ul style="list-style-type: none"> Pfizer se le tue prime due dosi sono state del vaccino Pfizer. Moderna se le tue prime due dosi sono state del vaccino Moderna. 	Pfizer se le tue prime due dosi sono state del vaccino Pfizer.
Quando sarò idoneo?	Almeno 28 giorni dalla tua seconda dose.	Almeno sei mesi dalla tua seconda dose.
Quale documentazione serve?	<ul style="list-style-type: none"> Prova dell'età Attestazione che hai una condizione medica di idoneità 	<ul style="list-style-type: none"> Prova dell'età Se hai meno di 65 anni, attestazione che hai una condizione medica di idoneità o sei a elevato rischio di esposizione.
Ci sono effetti collaterali?	Come per le prime due dosi, si possono avere effetti collaterali, come indolenzimento al braccio, mal di testa, dolori muscolari, stanchezza e febbre.	Come per le prime due dosi, si possono avere effetti collaterali, come indolenzimento al braccio, mal di testa, dolori muscolari, stanchezza e febbre.
Posso riceverlo insieme ad altri vaccini?	Sì, puoi ricevere un vaccino anti COVID-19 insieme ad altri vaccini o in qualsiasi momento prima o dopo.	Sì, puoi ricevere un vaccino anti COVID-19 insieme ad altri vaccini o in qualsiasi momento prima o dopo.
È gratuito?	Sì	Sì
Dove posso saperne di più?	Visita nyc.gov/covidvaccine e cerca " Third Dose for People Who are Immunocompromised " (terza dose	Visita nyc.gov/covidvaccine e cerca " Recommendation for Pfizer COVID-19 Booster Shots " (raccomandazioni per richiamo

	per immunocompromessi). Se hai domande, parla con il tuo operatore sanitario.	vaccinale anti COVID-19 di Pfizer). Se hai domande, parla con il tuo operatore sanitario.
--	---	---

Per trovare un centro vaccinale, visita il sito nyc.gov/vaccinefinder o chiama il numero 877-829-4692.