

## COVID-19 백신 3차 접종 vs. 부스터 접종

	3차 접종	부스터 접종
무엇입니까?	최초로 2차에 걸친 COVID-19 백신 접종을 받았으나 충분히 강력한 반응을 보이지 않은 사람들을 위한 추가 접종입니다.	COVID-19 백신으로 인해 보호력이 생겼지만, 시간이 지나면서 보호력이 떨어진 사람들을 위한 추가 접종입니다.
누가 접종 대상자입니까?	<b>12세 이상</b> 이며 <b>Pfizer</b> 또는 <b>Moderna</b> 백신을 접종 받았으며 중등도에서 중증으로 면역력이 저하된 사람	<b>18세 이상</b> 이며 <b>Pfizer</b> 백신을 접종 받았으며 다음 중 하나에 해당하는 고위험군 <ul style="list-style-type: none"> <li>연령(만 65세 이상) 또는 기저 질환으로 인한 중증의 COVID-19 질병</li> <li>거주지 또는 직장에 의한 COVID-19 노출</li> </ul>
왜 필요합니까?	연구에 따르면 면역력이 저하된 사람은 면역력에 문제가 없는 사람과 비교해 백신 반응성이 낮습니다. 3차 접종은 면역 반응을 개선할 수 있습니다.	일부의 연구에 따르면, 백신은 중증 질병에 매우 효과적이지만, 감염에 대한 보호력은 6개월 이후부터 감소할 수 있습니다. 부스터 접종은 추가적으로 보호를 제공할 수 있습니다.
어떤 백신을 접종합니까?	<ul style="list-style-type: none"> <li>최초 두 번의 접종이 Pfizer였을 경우 Pfizer</li> <li>최초 두 번의 접종이 Moderna였을 경우 Moderna</li> </ul>	최초 두 번의 접종이 Pfizer였을 경우 Pfizer
언제부터 접종 대상입니까?	2차 접종 후 최소 28일 이후	2차 접종 후 최소 6개월 이후
어떤 서류가 필요합니까?	<ul style="list-style-type: none"> <li>연령 증빙</li> <li>해당되는 질병을 앓고 있다는 증빙</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>연령 증빙</li> <li>65세 미만일 경우, 해당되는 질병 또는 노출 고위험에 대한 증빙</li> </ul>
부작용이 있습니까?	최초 두 번의 접종의 경우와 마찬가지로, 팔 욱신거림, 두통, 몸살, 피곤함, 발열 등의 부작용을 경험할 수 있습니다.	최초 두 번의 접종과 같이 팔 욱신거림, 두통, 몸살, 피곤함, 발열 등의 부작용을 경험할 수 있습니다.
다른 백신과 동시에 접종 받을 수 있습니까?	예, 다른 백신과 동시에 COVID-19 백신을 접종 받거나, 접종 이전 또는 이후 언제든지 받을 수 있습니다.	예, 다른 백신과 동시에 COVID-19 백신을 접종 받거나, 접종 이전 또는 이후 언제든지 받을 수 있습니다.
무료입니까?	예	예
어디서 자세한 내용을 확인할 수 있습니까?	<a href="https://nyc.gov/covidvaccine">nyc.gov/covidvaccine</a> 에서 " <a href="#">Third Dose for People Who are Immunocompromised</a> "(면역력이 저하된 사람을 위한 3차 접종)를 확인하십시오. 질문이 있을 경우 의료 서비스 제공자에게 문의하십시오.	<a href="https://nyc.gov/covidvaccine">nyc.gov/covidvaccine</a> 에 방문하여 " <a href="#">Recommendation for Pfizer COVID-19 Booster Shots</a> "(Pfizer COVID-19 부스터 접종에 대한 권고)를 확인하십시오. 질문이 있을 경우 의료 서비스 제공자에게 문의하십시오.

백신 접종소는 [nyc.gov/vaccinefinder](https://nyc.gov/vaccinefinder)를 방문하거나 877-829-4692번으로 연락해 주십시오.