

Третья доза вакцины от COVID-19 в сравнении с бустером

	Третья доза	Бустерная прививка
Что это?	Дополнительная доза вакцины для людей, у которых не было достаточно сильного ответа на первые две дозы вакцины от COVID-19	Дополнительная доза вакцины для людей, у которых возникла защита после вакцинации от COVID-19, но чья защита со временем могла снизиться
Кто имеет на них право?	Люди в возрасте 12 лет и старше , получившие вакцину Pfizer или Moderna , с ослабленным иммунитетом от умеренной до тяжелой степени	Люди в возрасте 18 лет и старше , которые получили вакцину Pfizer , и подвержены повышенному риску любого из следующих событий: <ul style="list-style-type: none"> • Тяжелое заболевание COVID-19, связанное с возрастом (65 лет и старше) или основным заболеванием. • Подверженность COVID-19 из-за того, где они живут или работают
Зачем это нужно?	Исследования показывают, что некоторые люди с ослабленным иммунитетом не реагируют на вакцины так же хорошо, как люди иммунитет которых не ослаблен. Третья доза может улучшить иммунный ответ.	Некоторые исследования показывают, что, хотя вакцина очень эффективна против тяжелых заболеваний, защита от инфекции может начать снижаться примерно через шесть месяцев. Бустерная прививка может обеспечить дополнительную защиту.
Какая вакцина?	<ul style="list-style-type: none"> • Pfizer, если ваши первые две дозы были Pfizer • Moderna, если ваши первые две дозы были Moderna 	Pfizer, если ваши первые две дозы были Pfizer
Когда я имею право на прививку?	Не раньше, чем через 28 дней после второй дозы	Не раньше, чем через 6 месяцев после второй дозы
Какие документы мне нужны?	<ul style="list-style-type: none"> • Подтверждение возраста • Подтверждение того, что у вас есть соответствующее заболевание 	<ul style="list-style-type: none"> • Подтверждение возраста • Если вы моложе 65 лет, подтверждение того, что у вас есть соответствующее заболевание или вы подвержены повышенному риску заражения
Есть ли побочные эффекты?	Как и в случае первых двух доз, у вас могут возникнуть побочные эффекты, такие как болезненность рук, головная боль, ломота в теле, усталость и жар.	Как и в случае первых двух доз, у вас могут возникнуть побочные эффекты, такие как болезненность рук, головная боль, ломота в теле, усталость и жар.
Могу ли я получить её одновременно с другими вакцинами?	Да, вы можете получить вакцину COVID-19 одновременно с другими вакцинами или в любое время до или после.	Да, вы можете получить вакцину COVID-19 одновременно с другими вакцинами или в любое время до или после.

Это бесплатно?	Да	Да
Где я могу узнать больше?	Перейдите на сайт nyc.gov/covidvaccine и найдите ссылку Третья доза для людей с ослабленным иммунитетом . Если у вас есть вопросы, поговорите со своим врачом.	Перейдите на сайт nyc.gov/covidvaccine и найдите ссылку Рекомендации по бустерным прививкам Pfizer от COVID-19 . Если у вас есть вопросы, поговорите со своим врачом.

Чтобы найти место вакцинации, перейдите на страницу nyc.gov/vaccinefinder или позвоните по телефону 877-829-4692.