

## COVID-19 疫苗第三剂与加强剂比较

	第三剂	加强剂
它是什么？	给未对前两剂 COVID-19 疫苗产生足够强烈反应的人士额外接种的一剂疫苗	给接种 COVID-19 疫苗后已建立保护能力、但保护能效或已随时间推移而下降的人士额外接种的一剂疫苗
谁有资格接种？	年龄 <b>12 岁及以上</b> 、接种了 <b>辉瑞 (Pfizer) 或莫德纳 (Moderna)</b> 疫苗且存在中度至重度免疫功能低下的人士	年龄 <b>18 岁及以上</b> 、接种了 <b>辉瑞 (Pfizer) 疫苗</b> 且存在出现下述任何一种情况之高风险的人士： <ul style="list-style-type: none"> <li>因年龄（65 岁或以上）或基础病而导致 COVID-19 重症</li> <li>因居住或工作地点原因而接触 COVID-19</li> </ul>
为何接种？	研究显示，部分免疫功能低下者对疫苗的反应不如免疫功能正常者。第三剂可能改善免疫反应。	部分研究显示，虽然疫苗防止重症效果很好，但预防感染的保护效力在约 6 个月后才可能开始下降。加强剂可提供额外保护。
接种哪款？	<ul style="list-style-type: none"> <li>如果前两剂是辉瑞，第三剂仍应为辉瑞</li> <li>如果前两剂是莫德纳，第三剂仍应为莫德纳</li> </ul>	如果前两剂是辉瑞，加强剂仍应为辉瑞
我何时有资格接种？	第二剂接种后至少 28 天	第二剂接种后至少 6 个月
需要哪些证明文件？	<ul style="list-style-type: none"> <li>年龄证明</li> <li>证明您有符合接种条件的健康状况</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>年龄证明</li> <li>未满 65 岁者需证明有符合接种条件的健康状况或更高的接触 COVID-19 风险</li> </ul>
是否有副作用？	与前两剂一样，您可能出现手臂酸痛、头疼、身体疼痛、疲倦和发烧等副作用反应。	与前两剂一样，您可能出现手臂酸痛、头疼、身体疼痛、疲倦和发烧等副作用反应。
能否与其他疫苗同时接种？	是的，您可以在接种其他疫苗的同时（或者之前或之后的任何时间）接种 COVID-19 疫苗。	是的，您可以在接种其他疫苗的同时（或者之前或之后的任何时间）接种 COVID-19 疫苗。
是否免费？	是的	是的
何处了解更详细信息？	请访问 <a href="https://nyc.gov/covidvaccine">nyc.gov/covidvaccine</a> 查找 <a href="#">Third Dose for People Who are Immunocompromised</a> （免疫功能低下者接种的第三剂）。如有任何疑问，请咨询您的医疗保健提供者。	请访问 <a href="https://nyc.gov/covidvaccine">nyc.gov/covidvaccine</a> 查找 <a href="#">Recommendation for Pfizer COVID-19 Booster Shots</a> （关于接种辉瑞 COVID-19 疫苗加强剂的建议）。如有任何疑问，请咨询您的医疗保健提供者。

如需查找疫苗接种站点，请访问 [nyc.gov/vaccinefinder](https://nyc.gov/vaccinefinder) 或致电 877-829-4692。