

COVID-19 ویکسین کی تیسری خوراکیں بمقابلہ بوسٹر

بوسٹر ٹیکہ	تیسری خوراک	یہ کیا ہے؟
ان لوگوں کے لیے ویکسین کی ایک اضافی خوراک جن میں COVID-19 ویکسین لگوانے سے حفاظت پیدا ہوئی، لیکن ان کی حفاظت وقت کے ساتھ کم ہو جانے کا امکان ہے	ان لوگوں کے لیے ویکسین کی ایک اضافی خوراک جن کو COVID-19 ویکسین کی پہلی دو خوراکیوں پر مناسب حد تک مضبوط رد عمل حاصل نہیں ہوا تھا	
18 سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد جن کو Pfizer ویکسین لگائی گئی اور وہ ان میں سے کسی ایک کے بڑھے ہوئے خطرے کی زد میں ہیں: <ul style="list-style-type: none"> اپنی عمر (65 سال یا اس سے زیادہ) یا بنیادی صحت کے عارضے کے باعث COVID-19 سے شدید بیمار پڑنا اپنی رہنے یا کام کرنے کی جگہ کے باعث COVID-19 کی زد میں آنا 	12 سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد جن کو Moderna یا Pfizer ویکسین لگائی گئی اور وہ معتدل سے شدید حد تک کمزور مدافعت کے حامل ہیں	کون اہل ہے؟
چند مطالعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگرچہ ویکسین شدید بیماری کے خلاف بہت اچھی کارکردگی دیتی ہے، انفکشن کے خلاف تحفظ تقریباً چھ ماہ بعد کم ہونا شروع ہو سکتا ہے۔ بوسٹر ٹیکہ اضافی تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔	مطالعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا مدافعتی نظام کمزور ہے وہ ویکسینوں پر اتنا اچھا رد عمل نہیں دکھاتے جتنا اچھا رد عمل وہ افراد دکھاتے ہیں جن کا مدافعتی نظام کمزور نہیں۔ تیسری خوراک مدافعتی رد عمل کو بہتر بنا سکتی ہے۔	کیوں لگوانا چاہیے؟
Pfizer اگر آپ کی پہلی دو خوراکیں Pfizer تھیں	<ul style="list-style-type: none"> Pfizer اگر آپ کی پہلی دو خوراکیں Pfizer تھیں Moderna اگر آپ کی پہلی دو خوراکیں Moderna تھیں 	کون سی ویکسین؟
اپنی دوسری خوراک کے کم از کم 6 ماہ بعد	اپنی دوسری خوراک کے کم از کم 28 دن بعد	میں کب اہل ہو جاؤں گا؟
<ul style="list-style-type: none"> عمر کا ثبوت اگر 65 سال سے کم عمر ہیں تو یہ تصدیق کریں کہ اہلیت پر پورا اترنے والا کوئی طبی مرض آپ کو لاحق ہے یا آپ زد میں آنے کے زیادہ خطرے سے دوچار ہیں 	<ul style="list-style-type: none"> عمر کا ثبوت یہ تصدیق کہ اہلیت دینے والا کوئی طبی مرض آپ کو لاحق ہے 	مجھے کون سے دستاویزات درکار ہوں گے؟
پہلی دو خوراکیوں کی طرح آپ کو ضمنی اثرات کا سامنا ہو سکتا ہے جیسے بازو میں سوزش، سر درد، جسم درد، تھکاوٹ اور بخار۔	پہلی دو خوراکیوں کی طرح آپ کو ضمنی اثرات کا سامنا ہو سکتا ہے جیسے بازو میں سوزش، سر درد، جسم درد، تھکاوٹ اور بخار۔	کیا کوئی ضمنی اثرات ہوتے ہیں؟
جی ہاں، آپ COVID-19 ویکسین دوسری ویکسینوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں لگوا سکتے ہیں، یا پھر اس سے پہلے یا بعد کسی بھی وقت لگوا سکتے ہیں۔	جی ہاں، آپ COVID-19 ویکسین دوسری ویکسینوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں لگوا سکتے ہیں، یا پھر اس سے پہلے یا بعد کسی بھی وقت لگوا سکتے ہیں۔	کیا میں اس کو دوسری ویکسینوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں لگوا سکتا ہوں؟
جی ہاں	جی ہاں	کیا یہ مفت ہے؟
<p>nyc.gov/covidvaccine پر جائیں اور تلاش کریں "Recommendation for Pfizer COVID-19 Booster Shots" (Pfizer کے COVID-19 بوسٹر ٹیکوں کے حوالے سے تجویز)۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے رجوع کریں۔</p>	<p>nyc.gov/covidvaccine پر جائیں اور تلاش کریں "Third Dose for People Who are Immunocompromised" (کمزور مدافعتی نظام کے حامل افراد کے لیے تیسری خوراک)۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے رجوع کریں۔</p>	مجھے مزید معلومات کہاں سے حاصل ہو سکتی ہیں؟

ویکسینیشن سائٹ تلاش کرنے کے لیے [nyc.gov/vaccinefinder](https://www.nyc.gov/vaccinefinder) پر جائیں یا 877-829-4692 پر کال کریں۔