

感染 HIV 的纽约居民现已符合接种 COVID-19 疫苗资格

在纽约市 (NYC) 和整个美国, 2019 冠状病毒病 (COVID-19) 仍然是重大风险。接种疫苗与采取其他预防措施双管齐下, 可以帮助我们结束 COVID-19 公共卫生紧急事件。

接种疫苗

疫苗对预防 COVID-19 非常有效。该疾病可能导致住院和死亡, 并引起长期健康问题。

居住在纽约州 (NYS) 的 HIV (艾滋病病毒) 感染者目前已全部获得接种 COVID-19 疫苗资格。如需查阅纽约州当前有资格接种 COVID-19 疫苗的所有群体清单, 请访问 nyc.gov/covidvaccinedistribution。

预约疫苗接种

请询问您的诊所或医院, 看他们能否为您接种疫苗。您也可以访问 vaccinefinder.nyc.gov 搜寻您附近的疫苗站点并进行预约。如果您需要有人协助您在本市营运的站点预约接种, 请致电 877-829-4692。疫苗供应有限, 因此请定期查看, 因为新的可预约档期会随着疫苗供应的增加而陆续开放出来。

接种日当天

如果在接种日当天感觉不适, 请重新预约。往返疫苗接种地点期间, 以及在接种时, 都要佩戴口罩; 如果您不戴口罩, 将不被允许入内。

您需要携带您居住在 NYS 或 NYC (取决于接种站点) 并有资格接种 COVID-19 疫苗的证明。如果您因为有 HIV 而符合资格, 且是由您的医疗保健提供者为您接种, 则保存在医疗保健提供者办公室的病历即可以作为资格证明。否则, 在进行预约时, 您需要填写一份[确认书](#), 确认您有使您符合接种资格的基础疾病。您无需陈述是何种疾病或提供任何其他证据来证明您患病。如需更多有关接种资格证明的信息, 请访问 nyc.gov/covidvaccine。

在接种后继续采取 COVID-19 预防措施

接种疫苗可以保护您免于出现 COVID-19 症状、住院和死亡。但我们仍需保持谨慎, 直至更多人接种了疫苗, 并且我们在疫苗保护我们周围尚未接种人员的效果方面有了更多了解。即使在接种之后, 也请继续[采取措施](#), 预防 COVID-19 传播:

- 如果您病了, 或是最近的 COVID-19 检测结果呈阳性, 请留在家中。
- 与他人保持至少 6 英尺的距离。
- 佩戴口罩。
- 经常洗手。

COVID-19 疫苗是安全的

美国食品药品监督管理局 (Food and Drug Administration, FDA) 已向数种 COVID-19 疫苗发放了紧急使用授权。这些 COVID-19 疫苗已经过了大规模临床试验, 有来数以万计自不同年

龄段、种族和族裔的人员参加。试验显示，使用这些疫苗是安全的，严重副作用非常罕见。常见的副作用包括接受注射的手臂出现酸痛或肿胀、头痛、身体酸痛、疲倦和发烧，程度从轻微到中度不等。疫苗不会导致 COVID-19 感染。

美国政府和研究机构还在持续监控疫苗的使用情况。

COVID-19 疫苗是有效的

所有获得授权的 COVID-19 疫苗都能非常有效地保护人们免于出现重症、住院和死亡。

CD4 细胞计数低或未接收 HIV 治疗的人群应接种疫苗

免疫系统因 HIV 或其他疾病而受损的人员没有参与 COVID-19 疫苗的临床试验，因此在疫苗对这类人员的安全性或有效性有多高方面，我们还没有数据。如果您的 CD4 细胞计数低或免疫系统功能低下，您可以接种疫苗。接种疫苗可能尤其对您有益，因为如果您感染了 COVID-19，可能会病得很严重。但是，疫苗在保护您免于感染 COVID-19 方面未必一定奏效。如果您有疑问，请咨询您的医疗保健提供者。

定期获取 HIV 护理

如果您不接受护理和治疗，HIV 会使您生病。请按照处方服用 HIV 治疗药物。将任何妨碍您服药或坚持治疗的困难告知您的医疗保健提供者。您可以通过电话、短信或视频聊天保持联系。如果您在获取药物方面遇到困难，请致电 800-542-2437 联系 NYS 未保险护理计划 (NYS Uninsured Care Programs)。如需寻找 HIV 护理提供者，请访问 [NYC Health Map](#) (NYC 健康地图) 或发短信 “CARE” 至 877-877。

如需更多有关 HIV 和 COVID-19 的信息，请参考 [NYC 健康与心理卫生局](#) 和 [美国卫生与公共服务部](#) 提供的指导。如需更多有关 COVID-19 疫苗的信息，请访问 nyc.gov/covidvaccine。如需有关 COVID-19 的信息，请访问 nyc.gov/health/coronavirus。

纽约市卫生局或顺应形势发展而调整建议。

3.24.21