


# 如果您的 COVID-19 檢測呈陽性或 是一名密切接觸者，應如何應對

下面的流程圖介紹了一般隔離和檢疫隔離指南。  
請諮詢您的學校或僱主，他們可能有不同的指示。



¹ 第一天是您的症狀開始或檢測結果呈陽性當日的第二天。

² 如果您在第五天時再次接受了 COVID-19 檢測，且**檢測結果呈陰性**，您就可以結束隔離，但在接下來的五天內與人相處時，請繼續佩戴緊密貼合的口罩。如果您的**檢測結果呈陽性**，則請繼續隔離 5 日。

³ 密切接觸者是在 24 小時內與一名 COVID-19 患者在相距不足 6 英尺的情況下相處（即使佩戴了口罩）了至少 15 分鐘的人員。一個人可以在其症狀開始前兩天（或者如果沒有症狀，則在檢測結果呈陽性前兩天）就已患上了 COVID-19。

⁴ 完全接種是指距離您接種強生疫苗、第二劑輝瑞疫苗或莫德納疫苗至少已過了兩週時間。

⁵ 5 至 11 歲的兒童如果在至少兩週前完成了 COVID-19 初始系列疫苗的接種，也不需要檢疫隔離，因為他們尚不符合接種加強針的資格。

⁶ 第一天是指您最後一次與 COVID-19 患者進行密切接觸的第二天。

⁷ 已經完全接種的人員可以接種加強針。如需更多資訊，請造訪 [nyc.gov/covidvaccine](https://nyc.gov/covidvaccine)。

如需更多資訊，請造訪 [on.nyc.gov/quarantine-isolation](https://on.nyc.gov/quarantine-isolation)。

紐約市衛生局或順應形勢發展而調整建議。2.4.22