

संघीय भागीदारों ने हाल ही में Johnson & Johnson (Janssen) के टीके की वजह से थोड़ी संख्या में हुई गंभीर प्रतिकूल घटनाओं के बारे में हमें चेतावनी दी है।

जबकि ये घटनाएं बहुत दुर्लभ लगती हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतते हुए, मंगलवार (4/13) से शुरू करके, हमने न्यूयॉर्क सिटी में Johnson & Johnson का टीका लगाना रोक दिया है।

FDA और CDC द्वारा जिन मामलों की समीक्षा की जा रही है उनमें एक किस्म का खून का थक्का बनना शामिल है जिसे सेरिब्रल वीनस साइनस थ्रोमबोसिस (CVST) कहा जाता है, जिसे खून की प्लेटलेट्स के कम स्तर (थ्रोमबोसाइटोपीनिया) के साथ जोड़कर देखा गया था।

वे लोग जिन्हें J&J का टीका लगाया गया है, जिन्हें टीका लगाने के बाद तीन सप्ताह के भीतर बहुत तेज़ सिरदर्द, पेट दर्द, टाँगों में दर्द, या साँस की कमी हुई है, उन्हें अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करना चाहिए।

COVID-19 के टीकों के बारे में और जानें:
nyc.gov/covidvaccine

