

وفاقی پارٹنرز نے حال ہی میں **Johnson & Johnson (Janssen)** ویکسین سے متعلق کم تعداد میں ہونے والے کچھ سنگین مضر واقعات کی جانب ہماری توجہ مبذول روائی ہے۔

اگرچہ یہ واقعات انتہائی کم دکھائی تعداد میں ہوتے نظر آئے ہیں، لیکن احتیاط کے طور پر ہم نے منگل (4/13) سے نیویارک سٹی میں **Johnson & Johnson** ویکسین لگانی روک دی ہے۔

FDA اور CDC کے زیر جائزہ کیسوں میں خون کے لوتھڑے کی ایک قسم، جسے سیری برال وینوس سائنس تھرومبوسس (CVST) کہا جاتا ہے، خون کی پلیٹلیٹس (تھرومبوسائٹوپینیا) کی کم سطح کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔

جن لوگوں کو J&J ویکسین لگوانے کے بعد تین ہفتوں کے اندر شدید سر درد، پیٹ میں درد، ٹانگوں میں درد، یا دم گھٹنے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، انہیں اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے رابطہ کرنا چاہیے۔

NYC

Health

Urdu

COVID-19 ویکسینوں کے بارے میں مزید جانیں:

nyc.gov/covidvaccine