


פארשטיין די קאָויד-19 וואַקסינען



דריי קאָויד-19 וואַקסינען — געמאכט דורך פייזער-בייאָוענטעק, מאָדערנא און דזשאַנסאן ענד דזשאַנסאן/דזשענסען — זענען באשטעטיגט געווארן פאר באנוץ דורך די פאראייניגטע שטאטן עסן און דראג אדמיניסטראציע (Food and Drug Administration, FDA). אלע דריי זענען זיכער און זייער ווירקזאם ביים באשיצן מענטשן פון שווערע קאָויד-19 קראנקייט, האספיטאליזאציע אדער טויט ח"ו. ווי שנעלער איר ווערט וואַקסירט, אלץ שנעלער וועט איר זיין באשיצט!

פייזער	
וועלכע סארט וואַקסין איז דאס?	מעסענדזשער RNA (mRNA). צו לערנען מער וועגן mRNA וואַקסינען, לייענט וויאזוי די mRNA קאָויד-19 וואַקסינען ארבעטן.
וויפיל דאזעס דארף איך באקומען?	צוויי. אייער צווייטע דאזע זאל זיין 21 טעג נאך אייער ערשטע דאזע, אבער איר זאלט באקומען אייער צווייטע דאזע נישט קיין חילוק וויפיל צייט עס איז שוין אריבער. מער פון 44,000.
וויפיל מענטשן האבן אנטיילגענומען אין די קלינישע פראבעס?	פאראייניגטע שטאטן, ארגענטינע, בראזיל, דייטשלאנד, טערקיע און דרום אפריקע.
וואו זענען די קלינישע פראבעס פארגעקומען?	<ul style="list-style-type: none"> 10% זענען געווען טונקל-הויטיגע 26% זענען געווען לאַטינאָ 4% זענען געווען אזיאנער 21% זענען געווען 65 יאר און עלטער 46% האבן געהאט אנדערע מעדיצינישע פראבלעמען
ווער האט אנטיילגענומען אין די קלינישע פראבעס?	די וואַקסין איז ערווארטעט צו באשיצן אויך קעגן די וואַריאנטן וואס זענען אידענטיפיצירט געווארן ביז היינט, אבער די שוץ וועט מעגליך נישט זיין די זעלבע שטארק קעגן טייל וואַריאנטן.
צו ארבעט די וואַקסין קעגן וואַריאנטן?	מיר ווייסן נאכנישט.
צו וועל איך דארפן באקומען נאך דאזעס אין די צוקונפט?	צוויי וואכן נאך אייער צווייטע איינשפריץ.
ווען איז די וואַקסין פולשטענדיג ווירקזאם?	ווייטאג אדער געשווילעכץ אויף די ארעם וואו איר האט באקומען די איינשפריץ, קאפוויי, ווייטאגן אין די גוף, מידיקייט און פיבער זענען די אפטסטע. זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) באווייזן זיך אפטער נאך די צווייטע דאזע און ווייניגער אפט ביי עלטערע מענטשן.
ווער קען באקומען די וואַקסין?	מענטשן פון 12 יאר און עלטער.
ווער זאל נישט באקומען די וואַקסין?	<ul style="list-style-type: none"> מענטשן וואס האבן געהאט א שווערע אדער באלדיגע אלערגישע רעאקציע צו סיי וועלכע באשטאנדטייל פון די וואַקסין אדער נאכן באקומען די ערשטע איינשפריץ. טייל מענטשן וואס האבן געהאט אין די פארגאנגענהייט אלערגישע רעאקציעס צו סיי וועלכע וואַקסין אדער מעדיצין וואס ווערט געגעבן אלץ איינשפריץ (רעדט צו אייער דאקטאר צו זעהן אויב איר קענט באקומען די פייזער וואַקסין).
וואס ליגט אין די וואַקסין?	mRNA, ליפידס, זאלצן און צוקער. פאר א פולע ליסטע פון די באשטאנדטיילן, זעהט די FDA אינפארמאציע בלאט.

מאָדערנא	
מעסענדזשער RNA (mRNA). צו לערנען מער וועגן mRNA וואַקסינען, לייענט וויאזוי די mRNA קאָויד-19 וואַקסינען ארבעטן.	וועלכע סארט וואַקסין איז דאס?
צוויי. אייער צווייטע דאזע זאל זיין 28 טעג נאך אייער ערשטע דאזע, אבער איר זאלט באקומען אייער צווייטע דאזע נישט קיין חילוק וויפיל צייט עס איז שוין אריבער.	וויפיל דאזעס דארף איך באקומען?
מער פון 30,000.	וויפיל מענטשן האבן אנטיילגענומען אין די קלינישע פראבעס?
פאראייניגטע שטאטן.	וואו זענען די קלינישע פראבעס פארגעקומען?
<ul style="list-style-type: none"> • 10% זענען געווען טונקל-הויטיגע • 20% זענען געווען לאַטינאָו • 5% זענען געווען אזיאנער • 25% זענען געווען 65 יאר און עלטער • 22% האבן געהאט אנדערע מעדיצינישע פראבלעמען 	ווער האט אנטיילגענומען אין די קלינישע פראבעס?
די וואַקסין איז ערווארטעט צו באשיצן אויך קעגן די וואַריאנטן וואס זענען אידענטיפיצירט געווארן ביז היינט, אבער די שוץ וועט מעגליך נישט זיין די זעלבע שטארק קעגן טייל וואַריאנטן.	צו ארבעט די וואַקסין קעגן וואַריאנטן?
מיר ווייסן נאכנישט.	צו וועל איך דארפן באקומען נאך דאזעס אין די צוקונפט?
צוויי וואכן נאך אייער צווייטע איינשפריץ.	ווען איז די וואַקסין פולשטענדיג ווירקזאם?
ווייטאג אדער געשווילעכץ אויף די ארעם וואו איר האט באקומען די איינשפריץ, קאפוויי, ווייטאגן אין די גוף, מידקייט און פיבער זענען די אפטסטע. זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) באווייזן זיך אפטער נאך די צווייטע דאזע און ווייניגער אפט ביי עלטערע מענטשן.	וואס זענען די מעגליכע זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס)?
מענטשן פון 18 יאר און עלטער.	ווער קען באקומען די וואַקסין?
<ul style="list-style-type: none"> • מענטשן וואס האבן געהאט א שווערע אדער באלדיגע אלערגישע רעאקציע צו סיי וועלכע באשטאנדטייל פון די וואַקסין אדער נאכן באקומען די ערשטע איינשפריץ. • טייל מענטשן וואס האבן געהאט אין די פארגאנגענהייט אלערגישע רעאקציעס צו סיי וועלכע וואַקסין אדער מעדיצין וואס ווערט געגעבן אלץ איינשפריץ (רעדט צו אייער דאקטאר צו זעהן אויב איר קענט באקומען די מאָדערנא וואַקסין). 	ווער זאל נישט באקומען די וואַקסין?
mRNA, ליפידס, זאלץ, אסיטיק עסיד, אמינס און צוקער. פאר א פולע ליסטע פון די באשטאנדטיילן, זעהט די FDA אינפארמאציע בלאט.	וואס ליגט אין די וואַקסין?



דזשאַנסאן ענד דזשאַנסאן	
וועלכע סארט וואַקסין איז דאס?	עדענאָוירוס וועקטאר. צו לערנען מער וואגן עדענאָוירוס וועקטאר וואַקסיןען, לייענט וויאזוי די דזשאַנסען ענד דזשאַנסען קאָויד-19 וואַקסין ארבעט.
וויפיל דאזעס דארף איך באקומען?	איינס.
וויפיל מענטשן האבן אנטיילגענומען אין די קלינישע פראבעס?	מער פון 40,000.
וואו זענען די קלינישע פראבעס פארגעקומען?	פאראייניגטע שטאטן, ארגענטינע, בראזיל, טשילע, קאלאמביע, מעקסיקא, פערו און דרום אפריקע.
ווער האט אנטיילגענומען אין די קלינישע פראבעס?	<ul style="list-style-type: none"> • 19% זענען געווען טונקל-הויטיגע • 45% זענען געווען לאַטיינאָ • 3% זענען געווען אזיאנער • 20% זענען געווען 65 יאר און עלטער • 41% האבן געהאט אנדערע מעדיצינישע פראבלעמען
צו ארבעט די וואַקסין קעגן וואַריאנטן?	די וואַקסין איז ערווארטעט צו באשיצן אויך קעגן די וואַריאנטן וואס זענען אידענטיפיצירט געווארן ביז היינט, אבער די שוץ וועט מעגליך נישט זיין די זעלבע שטארק קעגן טייל וואַריאנטן.
צו וועל איך דארפן באקומען נאך דאזעס אין די צוקונפט?	מיר ווייסן נאכנישט.
ווען איז די וואַקסין פולשטענדיג ווירקזאם?	צוויי וואכן נאך אייער איינשפריץ.
וואס זענען די מעגליכע זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס)?	<ul style="list-style-type: none"> • ווייטאג אדער געשווילעכץ אויף די ארעם וואו איר האט באקומען די איינשפריץ, קאפוויי, ווייטאגן אין די גוף, מידקייט און פיבער זענען די אפטסטע. זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) זענען ווייניגער אפט ביי עלטערע מענטשן. • עס איז דא א קליינע סכנה פון א זעלטענע סארט בלוט קלאַט. פאר מער אינפארמאציע, לייענט אַפּדעיט איבער די דזשאַנסען ענד דזשאַנסען/דזשענסען קאָויד-19 וואַקסין.
ווער קען באקומען די וואַקסין?	מענטשן פון 18 יאר און עלטער.
ווער זאל נישט באקומען די וואַקסין?	<ul style="list-style-type: none"> • מענטשן וואס האבן געהאט א שווערע אדער באלדיגע אלערגישע רעאקציע צו סיי וועלכע באשטאנדטייל אין די וואַקסין. • טייל מענטשן וואס האבן געהאט אין די פארגאנגענהייט אלערגישע רעאקציעס צו סיי וועלכע וואַקסין אדער מעדיצין וואס ווערט געגעבן אלץ איינשפריץ (רעדט צו אייער דאקטאר צו זעהן אויב איר קענט באקומען די דזשאַנסאן ענד דזשאַנסאן וואַקסין).
וואס ליגט אין די וואַקסין?	עדענאָוירוס, זאלצן, אלקאהאל, פּאָליסאַרבעיט 80, היידראָקלאריק עסיד און אמינאָ עסידס. פאר א פולע ליסטע פון די באשטאנדטיילן, זעהט די FDA אינפארמאציע בלאט.

פאר מער אינפארמאציע וועגן קאָויד 19 וואַקסיןען, באזוכט [nyc.gov/covidvaccine](https://www.nyc.gov/covidvaccine).

