



ФОРМА ПОДБОРА АНТИБИОТИКОВ 1

Аккуратно заполните форму ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ ручкой или карандашом, или же введите данные на компьютере. Используйте буквы латинского алфавита, которые используются в таких языках, как английский язык (например, А, В, С, D и т.д.)

EXAMPLE123

Отмечайте круги таким образом: НЕ перечеркивайте круги:

Укажите следующую информацию о лице, которое будет принимать антибиотик. Эта информация будет использована Департаментом здравоохранения (Health Department) в случае широкомасштабной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Информация и инструкции приведены на странице 2. Чтобы получить антибиотик в пункте выдачи (Point of Dispensing, POD), вам необходимо ответить на вопросы 1–9.

Имя (First Name)

Фамилия (Last Name)

Дата рождения (ММ/ДД/ГГГГ)

Домашний почтовый индекс

Пол

Женский Мужской Трансгендер Человек с небинарной идентичностью

1. Случалась ли когда-либо у человека, который будет принимать антибиотик, тяжелая аллергическая реакция на доксициклин или тетрациклины, потребовавшая медицинской помощи?

Да Yes Нет No

2. Является ли лицо, которое будет принимать антибиотик, беременной женщиной?

Да Нет

3. Случалась ли когда-либо у человека, который будет принимать антибиотик, тяжелая аллергическая реакция на ципрофлоксацин (Cipro) или другие фторхинолоны, потребовавшая медицинской помощи?

Да Нет

4. Страдает ли человек, который будет принимать антибиотик, миастенией гравис?

Да Нет

5. Принимает ли человек, который будет принимать антибиотик, препарат «Тизанидин» («Занафлекс»)?

Да Нет

6. Принимает ли человек, который будет принимать антибиотик, препарат «Теofilлин»?

Да Нет

7. Страдает ли человек, который будет принимать антибиотик, заболеванием почек или проходит ли диализ?

Да Нет

8. Человек, который будет принимать антибиотик, неспособен глотать таблетки?

Да Нет

9. Весит ли человек, который будет принимать антибиотик, менее 76 фунтов или 35 кг?

Да Нет

Если ответ «да», укажите вес: _____ фунтов или _____ кг

ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЮТ СОТРУДНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Medical Evaluation

- Rx: Ciprofloxacin suspension _____ mg Q12h X 10 days
- Rx: Clindamycin _____ mg Q8h X 10 days
- Rx: Amoxicillin _____ mg Q8h X 10 days
- Doxycycline (C)
- Doxycycline Only
- Ciprofloxacin Only

Notes _____

Signature _____ License # _____

Screening

- Doxycycline (C)
- Doxycycline Only
- Ciprofloxacin Only
- Medical Evaluation

Initials _____

Я получаю антибиотик для себя. Я согласен (-на) принимать антибиотик в соответствии с указаниями.

ЛИБО

Я получаю антибиотик для лица, указанного выше в этом документе. Я согласен (-на) предоставить антибиотик и все инструкции лицу, указанному выше в этом документе.

Укажите свои имя и фамилию печатными буквами _____ Подпись _____ Дата _____

_____ _____ _____

Информация и инструкции

Когда вы заполните форму и нажмете «Проверка/печать формы», компьютер определит, какой антибиотик вы получаете. Распечатайте заполненную форму и принесите ее с собой в пункт выдачи. Это позволит сотрудникам пункта быстрее вас обслужить. В пунктах выдачи также можно получить экземпляр незаполненной формы.

Вопрос №1. Тяжелая аллергическая реакция – это опасная для жизни реакция, которая может привести к нарушению дыхания и (или) глотания, отеку лица, глаз или языка или к боли в груди. Распространенные побочные эффекты антибиотиков включают жидкий стул и расстройство желудка. Они не считаются тяжелыми аллергическими реакциями.

Тетрациклины — это группа антибиотиков (включающая доксициклин, миноциклин и тетрациклин), которые используют для профилактики или лечения бактериальных инфекций. Лицам, перенесшим тяжелую аллергическую реакцию на доксициклин или другие тетрациклины, нельзя принимать доксициклин. Таким лицам нужно ответить «да» на этот вопрос.

Вопрос № 2. Ципрофлоксацин обычно является предпочтительным антибиотиком для беременных. Однако если беременная женщина подверглась воздействию бактерии сибирской язвы, можно также принимать доксициклин для предотвращения заражения сибирской язвой. Беременная женщина может получать либо доксициклин, либо ципрофлоксацин в зависимости от ответов на другие вопросы анкеты. Таким лицам следует ответить «да» на этот вопрос.

Вопрос № 3. Тяжелая аллергическая реакция – это опасная для жизни реакция, которая может привести к нарушению дыхания и (или) глотания, отеку лица, глаз или языка или к боли в груди. Распространенные побочные эффекты антибиотиков включают жидкий стул и расстройство желудка. Они не считаются тяжелыми аллергическими реакциями.

Фторхинолоны — это группа антибиотиков (включающая ципрофлоксацин, левофлоксацин и моксифлоксацин), которые используют для профилактики или лечения бактериальных инфекций. Лицам, перенесшим тяжелую аллергическую реакцию на ципрофлоксацин или другие фторхинолоны, нельзя принимать ципрофлоксацин. Таким лицам нужно ответить «да» на этот вопрос.

Вопрос №4. Миастения гравис — это хроническое заболевание, которое вызывает мышечную слабость. Ципрофлоксацин может усугубить симптомы миастении гравис. Доксициклин не оказывает такого эффекта. Лицам, которым когда-либо ставили диагноз «миастения гравис», нельзя принимать ципрофлоксацин. Таким лицам нужно ответить «да» на этот вопрос.

Вопрос № 5. Тизанидин (занафлекс) — это лекарственный препарат, который снимает спазмы мышц. Ципрофлоксацин может усугубить побочные эффекты тизанидина (занафлекса). Доксициклин не оказывает такого эффекта. Человеку, Лицам, принимающим настоящее время тизанидин (занафлекс), нельзя принимать ципрофлоксацин. Таким лицам нужно ответить «да» на этот вопрос.

Вопрос № 6. Теофиллин — это лекарственный препарат, который используют для лечения некоторых нарушений дыхания. Ципрофлоксацин может усугубить побочные эффекты теофиллина. Доксициклин не оказывает такого эффекта. Лицам, принимающим в настоящее время теофиллин, можно принимать ципрофлоксацин, но при этом нужно проверять уровень теофиллина. Таким лицам следует ответить «да» на этот вопрос.

Вопрос №7. Подзаболеванием почек подразумевается заболевание, при котором почки повреждены и не могут должным образом фильтровать кровь. Повреждение почек снижает способность организма перерабатывать ципрофлоксацин. Повреждение почек не снижает способность организма перерабатывать доксициклин. Человеку с заболеванием почек или на диализе можно принимать ципрофлоксацин, но может потребоваться пониженная доза. Таким лицам следует ответить «да» на этот вопрос.

Вопрос № 8. Человек, неспособный глотать таблетки, может вырвать, поперхнуться или подавиться таблеткой. Таким лицам нужно получать жидкие антибиотики или антибиотики, которые можно раскрошить. Лицам, неспособным глотать таблетки, нужно ответить «да» на этот вопрос.

Вопрос № 9. Лицам, которые весят меньше 76 фунтов или 35 килограммов, может потребоваться пониженная доза антибиотика. Таким лицам следует ответить «да» на этот вопрос и указать свой вес.