

Choroba dziąseł



Choroba dziąseł lub opuchlizna dziąseł mogą się nasilać w miarę upływu czasu. Zazwyczaj jest bezbolesna, aż do czasu, gdy stanie się bardzo zaawansowana i może spowodować utratę zębów. Gdy do tego dojdzie, jedzenie, rozmawianie i uśmiechanie się staje się trudne.

Odsłonięte dziąsła są spowodowane przez chorobę dziąseł. Choroba dziąseł może spowodować utratę zęba.

Co powoduje chorobę dziąseł?

Bakterie znajdujące się w płytce nazębnej – warstwie, która tworzy się wokół zębów – powodują chorobę dziąseł.

Jakie są oznaki i objawy choroby dziąseł?

- Opuchnięte dziąsła
- Krwawienie z dziąseł po szczotkowaniu zębów
- Zmiana dopasowania częściowych protez zębowych
- Ruszające się zęby
- Utrzymujący się nieświeży oddech



W jaki sposób zapobiegać chorobie dziąseł:

1. Należy szczotkować zęby co najmniej dwa razy dziennie miękką szczoteczką do zębów i pastą do zębów zawierającą fluor.
2. Należy używać nici dentystycznej co najmniej raz dziennie.
3. Należy regularnie odwiedzać stomatologa w celu kontroli i czyszczenia zębów.
4. Należy porozmawiać z lekarzem lub stomatologiem w przypadku chorowania na cukrzycę. Osoby chore na cukrzycę mogą cierpieć na nasiloną chorobę dziąseł. Choroba dziąseł może również wpłynąć na pogorszenie się cukrzycy.

W przypadku konieczności skorzystania z opieki stomatologicznej lub odczuwania bólu należy niezwłocznie skorzystać z pomocy stomatologa lub dostawcy usług medycznych.