

ข้อมูลสำคัญ: กลุ่มอาการอักเสบของหลายอวัยวะในเด็ก (MIS-C)

กลุ่มอาการอักเสบของหลายอวัยวะในเด็กคืออะไร

กลุ่มอาการอักเสบของหลายอวัยวะในเด็ก (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children หรือ MIS-C) เป็นอาการทางการแพทย์ใหม่ที่เกี่ยวโยงกับโควิด-19 และเริ่มปรากฏในเด็กในนครนิวยอร์ก (NYC) และที่อื่น ๆ แต่เดิมกลุ่มอาการนี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “pediatric multi-system inflammatory syndrome” หรือ PMIS

MIS-C มีความคล้ายคลึงกับอาการอักเสบรุนแรงอื่น ๆ เช่น [โรคคาวาซากิ](#) และกลุ่มอาการที่อวัยวะช็อก เด็ก ๆ ที่มี MIS-C อาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและอวัยวะอื่น ๆ และต้องได้รับการบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล

MIS-C เป็นอาการที่พบไม่บ่อย แต่เนื่องจากเด็ก ๆ ที่มีอาการนี้อาจล้มป่วยในขั้นวิกฤตได้ ผู้ปกครองจึงจำเป็นต้องทราบถึงสัญญาณเตือนและอาการแสดงต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ อาจมีเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือได้ทัน่วงที

MIS-C มีสัญญาณเตือนหรืออาการแสดงอย่างไร

เด็กส่วนใหญ่มีไข้ (อุณหภูมิ 100.4 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 38.0 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า) นานหลายวัน รวมถึงอาการแสดงอื่น ๆ

อาการแสดงที่พบบ่อยอื่น ๆ ประกอบด้วย:

- หงุดหงิดหรือทำกิจกรรมน้อยลง
- เจ็บท้องโดยที่ไม่มีสาเหตุอื่น
- ท้องเสีย
- อาเจียน
- ผดผื่น
- โรคตาแดง
- ความอยากอาหารลดลง
- ริมฝีปากแดงและแห้งแตก หรือลิ้นเป็นสีแดงเป็นปุ่มเหมือนสตรอว์เบอร์รี่
- มือเท้าบวม อาจจะแดงด้วย

ฉันควรโทรติดต่อแพทย์ประจำตัวของเด็กในความคุ้มครองของฉันหรือรับบริการฉุกเฉินเมื่อใด

คุณควร โทรติดต่อแพทย์ทันทีหากเด็กป่วยและมีไข้ต่อเนื่อง รวมถึงมีอาการอื่น ๆ ตามที่ระบุข้างต้น แพทย์จะสอบถามสัญญาณเตือนหรืออาการแสดงที่เด็กมี และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อแนะนำขั้นตอนต่อไป หากเด็กป่วยหนัก คุณควรพาไปที่ห้องฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด หรือโทรติดต่อ 911 ทันที

MIS-C ติดต่อกันได้หรือไม่

MIS-C ติดต่อกันไม่ได้ แต่เป็นไปได้ว่าเด็กในความคุ้มครองของคุณจะติดเชื้อโควิด-19 หรือติดเชื้ออื่น ๆ ที่อาจติดต่อกันได้ นี่คือเหตุผลที่โรงพยาบาลจะใช้มาตรการควบคุมการติดเชื้อเมื่อต้องรักษาเด็กในความคุ้มครองของคุณ

MIS-C รักษาได้หรือไม่

ตอนนี้เด็กที่มีอาการ MIS-C จะได้รับการรักษาด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมถึงการให้ยาที่ส่งผลโดยตรงต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและภาวะอักเสบ นอกจากนี้ยังมีการให้ยาอื่น ๆ กับเด็กเพื่อปกป้องหัวใจไต และอวัยวะอื่น ๆ

ฉันจะปกป้องเด็กในความคุ้มครองของฉันจากการป่วยเป็น MIS-C ได้อย่างไร

คุณควรปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อปกป้องเด็กจากความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 การใส่หน้ากาก การรักษาความสะอาดของมือ และการเว้นระยะห่างทางกายภาพเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เด็ก ๆ ที่มีอาการร่วมทางการแพทย์อื่น ๆ อาจมีความเสี่ยงสูงกว่าที่จะเกิดปฏิกิริยาที่ไม่ดีต่อโควิด-19 ทำให้มาตรการป้องกันมีความสำคัญยิ่งกว่าเดิม