

紐約市爆發麻疹

獲取關於疫苗的最新消息

事實：目前麻疹在紐約市 (NYC) 大面積爆發，這種傳染性極強的病毒主要出現在威廉斯堡 (Williamsburg)、布魯克林 (Brooklyn) 菠羅公園 (Borough Park)。

事實：2019 年 4 月 9 日，紐約市衛生局局長宣佈公共衛生緊急狀況 (Public Health Emergency)，並令居住、工作或停留在 11205、11206、11211 和 11249 郵政區域內的所有成人和兒童接種疫苗。

事實：若衛生局 (Health Department) 查明在 11205、11206、11211 和 11249 郵編區域內有人未接種疫苗，則此人、家長或監護人可能受到 1,000 美元罰款。

事實：麻疹可在接種麻疹腮腺炎風疹疫苗 (MMR) 後輕易預防。

- 若您還未接種疫苗，請立即接種麻疹腮腺炎風疹疫苗。若您不知道自己接種疫苗的情況，請與您的醫生核實。
- 若您需要找一家可以接種麻疹疫苗的診所，請撥打 311 或訪問 nyc.gov/health 并搜索麻疹 (measles)。
- 無論您移民狀況為何，是否有支付能力，您都可在衛生局在布魯克林格林堡 (Fort Greene) 的免疫診所 (Immunization Clinic) 和紐約市衛生醫院 (NYC Health + Hospitals) 接種麻疹腮腺炎風疹疫苗。

Q&A

什麼是麻疹？

麻疹是一種可以引起發燒和皮疹的病毒；可致死。

誰會得麻疹？

- 任何人都會在任何年齡得麻疹。
- 麻疹對任何年齡的人群都很嚴重，但危害最大的人群有嬰兒和幼兒、孕婦、免疫系統脆弱的人群、對麻疹不免疫的成人。

如何預防麻疹？

- 預防麻疹的最佳方式是接種疫苗，安全又有效。
- 若您的孩子不滿 6 個月，請讓他們遠離病人。若您的孩子接觸過麻疹，請致電您的醫生諮詢。
- 若您患有麻疹，請在皮疹開始後在家中停留四天—若您外出，您將把麻疹傳染給他人。若您生病需看醫生，請提前致電，以便他們能告知您如何防止把麻疹傳染給他人。

誰需要接種麻疹疫苗？

- 每個人。
- 根據衛生局局長命令，居住、工作或停留在 11205、11206、11211 和 11249 郵編區域內的每個成人和兒童都必須接種疫苗。因病情無法接種疫苗的人不必接種。
- 居住在或去過這些郵編區域托兒所的兒童必須在 6 到 11 個月期間為得到額外保護提前補種疫苗，這些郵編區域的兒童未接種疫苗前不能上學。
- 其他嬰兒也應盡早補種疫苗，請查看下方問題和答案以獲取指示。

- 接種過麻疹腮腺炎風疹疫苗第一針的 1 歲及以上兒童的家長應諮詢醫生，若居住在或停留過威廉斯堡、菠羅公園或皇冠高地 (Crown Heights)，或其他任何爆發過麻疹的地區，請考慮提前接種第二針疫苗。
- 若您選擇不為兒童接種疫苗，則您會使兒童和他人的生命受到危害。

我需要接種疫苗嗎，若：

- 我懷孕了？
 - 若您已懷孕並對麻疹免疫，則其對孕期無風險。若您無接種疫苗紀錄，向醫生諮詢。
- 我的嬰兒 6 到 11 個月大？
 - 11205、11206、11211 和 11249 郵編區域內的嬰兒必須接種疫苗。
 - 菠羅公園或皇冠高地的嬰兒應接種疫苗。
 - 正統猶太教 (Orthodox Jewish) 社區和居住在紐約市其他街區的嬰兒和兒童家長應諮詢醫生，並考慮提前接種麻疹腮腺炎風疹疫苗。
- 我在威廉斯堡工作？
 - 需要。根據局長命令，若您在 11205、11206、11211 和 11249 郵編區域內工作，則您需要接種疫苗，或出示麻疹免疫證明。若您沒有接種疫苗紀錄，向醫生諮詢。
- 我在威廉斯堡停留過？
 - 全體紐約民眾都需核實是否對麻疹免疫。若您還沒有接種過麻疹腮腺炎風疹疫苗，請現在接種。

麻疹如何傳播？

- 當患麻疹的人打噴嚏或咳嗽時，他人在隨後的兩小時內可吸入病毒，並可能患上麻疹。
- 麻疹傳染性極強。若一人患有麻疹，則其身邊未接種疫苗或不免疫的人 90% 也都會患麻疹。
- 患有麻疹的人可在風疹出現前四天中傳播病毒。

麻疹的症狀有哪些？

- 早期症狀包括發燒、咳嗽、流鼻涕、紅眼或流淚。三至五天後出現風疹紅點。
- 併發症包括腹瀉、耳朵炎症、肺炎、癲癇、腦炎和死亡。
- 若您發現症狀，請立即致電醫生。您的醫生將告知怎樣可以不把麻疹傳染給他人。

如何治療麻疹？

- 只有一種特定藥物能夠治療麻疹。發燒等一些症狀可用藥物治療。

麻疹疫苗會引起自閉症嗎？

- 不會。科學研究已證明疫苗和自閉症無關。