

纽约市爆发麻疹

获取关于疫苗的最新消息

事实：目前麻疹在纽约市 (NYC) 大面积爆发，这种传染性极强的病毒主要出现在威廉斯堡 (Williamsburg)、布鲁克林 (Brooklyn) 菠萝公园 (Borough Park)。

事实：2019 年 4 月 9 日，纽约市卫生局局长宣布公共卫生紧急状况 (Public Health Emergency)，并令居住、工作或停留在 11205、11206、11211 和 11249 邮编区域内的所有成人和儿童接种疫苗。

事实：若卫生局 (Health Department) 查明在 11205、11206、11211 和 11249 邮编区域内有人未接种疫苗，则此人、其家长或监护人可能受到 1,000 美元罚款。

事实：麻疹可在接种麻疹腮腺炎风疹疫苗 (MMR) 后轻易预防。

- 若您还未接种疫苗，请立即接种麻疹腮腺炎风疹疫苗。若您不知道自己接种疫苗的情况，请与您的医生核实。
- 若您需要找一家可以接种麻疹疫苗的诊所，请拨打 311 或访问 nyc.gov/health 并搜索麻疹 (measles)。
- 无论您移民状况为何，是否有支付能力，您都可在卫生局在布鲁克林格林堡 (Fort Greene) 的免疫诊所 (Immunization Clinic) 和纽约市卫生医院 (NYC Health + Hospitals) 接种麻疹腮腺炎风疹疫苗。

Q&A

什么是麻疹？

麻疹是一种可以引起发烧和皮疹的病毒；可致死。

谁会得麻疹？

- 任何人都会在任何年龄得麻疹。
- 麻疹对任何年龄的人群都很严重，但危害最大的人群有婴儿和幼儿、孕妇、免疫系统脆弱的人群、对麻疹不免疫的成人。

如何预防麻疹？

- 预防麻疹的最佳方式是接种疫苗，安全又有效。
- 若您的孩子不满 6 个月，请让他们远离病人。若您的孩子接触过麻疹，请致电您的医生咨询。
- 若您患有麻疹，请在皮疹开始后在家中停留四天—若您外出，您将把麻疹传染给他人。若您生病需看医生，请提前致电，以便他们能告知您如何防止把麻疹传染给他人。

谁需要接种麻疹疫苗？

- 每个人。
- 根据卫生局局长命令，居住、工作或停留在 11205、11206、11211 和 11249 邮编区域内的每个成人和儿童都必须接种疫苗。因病情无法接种疫苗的人不必接种。
- 居住在或去过这些邮编区域托儿所的儿童必须在 6 到 11 个月期间为得到额外保护提前补种疫苗，这些邮编区域的儿童未接种疫苗前不能上学。
- 其他婴儿也应尽早补种疫苗，请查看下方问题和答案以获取指示。

- 接种过麻疹腮腺炎风疹疫苗第一针的 1 岁及以上儿童的家长应咨询医生，若居住在或停留过威廉斯堡、波罗公园或皇冠高地 (Crown Heights)，或其他任何爆发过麻疹的地区，请考虑提前接种第二针疫苗。
- 若您选择不为儿童接种疫苗，则您会使儿童和他人的生命受到危害。

我需要接种疫苗吗，若：

- 我怀孕了？
 - 若您已怀孕并对麻疹免疫，则其对孕期无风险。若您无接种疫苗纪录，向医生咨询。
- 我的婴儿 6 到 11 个月大？
 - 11205、11206、11211 和 11249 邮编区域内的婴儿必须接种疫苗。
 - 波罗公园或皇冠高地的婴儿应接种疫苗。
 - 正统犹太教 (Orthodox Jewish) 社区和居住在纽约市其他街区的婴儿和儿童家长应咨询医生，并考虑提前接种麻疹腮腺炎风疹疫苗。
- 我在威廉斯堡工作？
 - 需要。根据局长命令，若您在 11205、11206、11211 和 11249 邮编区域内工作，则需要接种疫苗，或出示麻疹免疫证明。若您没有接种疫苗纪录，向医生咨询。
- 我在威廉斯堡停留过？
 - 全体纽约民众都需核实是否对麻疹免疫。若您还没有接种过麻疹腮腺炎风疹疫苗，请现在接种。

麻疹如何传播？

- 当患麻疹的人打喷嚏或咳嗽时，他人在随后的两小时内可吸入病毒，并可能患上麻疹。
- 麻疹传染性极强。若一人患有麻疹，则其身边未接种疫苗或不免疫的人 90% 也都会患麻疹。
- 患有麻疹的人可在风疹出现前四天中传播病毒。

麻疹的症状有哪些？

- 早期症状包括高烧、咳嗽、流鼻涕、红眼或流泪。三至五天后出现风疹红点。
- 并发症包括腹泻、耳朵炎症、肺炎、癫痫、脑炎和死亡。
- 若您发现症状，请立即致电医生。您的医生将告知怎样可以不把麻疹传染给他人。

如何治疗麻疹？

- 只有一种特定药物能够治疗麻疹。发烧等一些症状可用药物治疗。

麻疹疫苗会引起自闭症吗？

- 不会。科学研究已证明疫苗和自闭症无关。