

طريقة تناول Doxy PEP

يجب تناول Doxy PEP (المضاد الحيوي دوكسيسايكلين) بعد ممارسة الجنس بدون واق ذكري — وتشمل ممارسة الجنس عن طريق الفم أو الشرج أو المهبل دون استخدام وافي ذكري طوال الوقت — حيث إنه يقلل من احتمالية إصابتك بمرض الزهري والسيلان والكلاميديا.

يصبح Doxy PEP فعالاً أكثر عند تناوله في غضون 24 ساعة من ممارسة الجنس بدون استخدام الواقي الذكري.

ممارسة الجنس يومياً (أو أكثر من مرة في اليوم)

تناول حبتين بتركيز 100 مليجرام (مجم) من دوكسيسايكلين في غضون 24 ساعة (وفي موعد لا يتجاوز 72 ساعة) بعد ممارسة الجنس بدون استخدام الواقي الذكري.

تناول دوكسيسايكلين بشكل متكرر يومياً عند ممارسة الجنس بدون استخدام الواقي الذكري، لكن لا تتناول أكثر من 200 مجم (حبتين بتركيز 100 مجم) في غضون 24 ساعة.

تناول الجرعة الأخيرة بعد مرور 24 ساعة على الأقل من تناول الجرعة السابقة وفي غضون 72 ساعة من آخر مرة مارست فيها الجنس بدون واقٍ ذكري.



تناول حبتين بعد ممارسة الجنس

24 ساعة

48 ساعة

72 ساعة

الإطار الزمني المثالي

الإطار الزمني المقبول

للحصول على أحدث المعلومات بخصوص خدمات عيادة الصحة الجنسية ومواقعها وساعات عملها، امسح ضوئياً رمز الاستجابة السريعة، أو اتصل بالرقم 311 أو تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني nyc.gov/health/sexualhealthclinics. لتحديد موعد في إحدى عيادات Express Clinic لإجراء فحص سريع للعدوى المنقولة جنسياً (sexually transmitted infection, STI)، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني bit.ly/sti-scheduling. للحصول على الخدمات الطبية عن بُعد المتعلقة بـ HIV و STI ووسائل منع الحمل وإجهاض الحمل بالأدوية، اتصل بالخط الساخن لعيادة الصحة الجنسية على الرقم 347-396-7959، من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3:30 مساءً.

مُعَدَّل ومُستخدَم بموافقة من San Francisco Department of Public Health (إدارة الصحة العامة في سان فرانسيسكو).



NYC
Health